

醫國學入門

七卷上

#13366009III
v. 14

編註醫學入門 七卷上

婦人用藥賦

調經 五葉 崩中漏下

六 帶下 八 癥瘕

九 胃胎 胎安 臨產 十三 產後

小兒用藥賦

十六 驚風 十八 積 十八 風寒 十八 痰喘 十九 諸熱 變熱

二十 痘疹

外科用藥賦

廿四 癰疽 廿八 腦疽 廿八 頭瘡 廿八 瘰癧 廿一 痰核

廿一 癰瘤 廿一 乳核 廿一 乳癰 廿二 肺癰 廿二 肺痿

廿二 心癰 廿二 瘰生脇下 廿三 胃癰 廿三 腸癰

廿三 便毒 廿三 懸癰 廿三 痔 廿五 漏 廿六 男婦陰瘡

廿七 囊瘻 附骨疽 廿七 人面 廿七 傷手 廿七 外癰

廿八 內癰 廿八 瘡疥 廿九 頑癬 廿九 血風 卅 癩風

卅 大麻 卅 紫雲 卅 楊梅癰 卅 疔 卅 折傷

六 破傷風

七 通用外科

九 洗點敷

一 藥線

一 取濃

一 生肌

一 斷血

二 飲口

二 貼膏

五 拾遺諸藥方

一 雜病婦人小兒外科總方
一 氣 二 血 三 痰 三 鬱

醫門

卷上

醫人出藥

醫藥

醫藥中

醫藥

醫藥

編註醫學入門外集卷之七

婦人小兒外科用藥賦製法見本草

婦人之病與男無異經絡氣血只分於胞絡多病瘕瘕胎產

全屬乎衝任調經固經香附四製七製或單製調經散當歸一錢半

麥門冬二錢吳萸肉桂各五分人參半夏白芍川芎牡丹皮各一錢阿膠甘草各七分半姜煎服治經水或前後或

多少或逾月不至或一月再至○小調經散當歸赤芍桂心各一兩沒藥琥珀甘草各一錢細辛麝香各五分為末

酒入姜汁調服五分治敗血停積五臟日久膏癰成水變為浮腫忌用利水之藥產後浮腫亦宜○周經丸黃芩白

芍龜板各一兩椿根皮七錢黃柏三錢香附二錢半為末酒糊丸梧子大每五十丸酒下治經水過多○四製香附

丸香附一片四分用酒醋童便鹽水各浸七日焙乾為末醋糊丸梧子大每七十丸空心鹽酒下治經候不調

瘦人加澤蘭葉赤茯苓又合四物湯各四兩加白朮陳
澤蘭葉各二兩黃柏甘草各一兩名十味香附丸○七製
香附丸香附米十四兩分七分一分一分同當歸二兩酒浸
分同義木二兩重便浸一分同牡丹皮艾葉各一兩米泔
浸一分同烏藥二兩米泔浸一分同川芎玄胡索各一兩
水浸一分同三稜北胡各一兩醋浸一分同紅花烏梅各
一兩鹽水浸春三夏二秋七冬十日曬乾取單香附為末
浸藥水打糊為丸梧子大每八十九丸臨卧酒下治諸虛百
損氣血不調月水前後結成癰瘕或骨蒸發熱四肢無力
○單香附丸香附一斤用米泔浸一宿曬乾又以米醋於
砂鍋內同煮旋添旋煮以極透爛為度取焙為末醋糊丸
梧子大每服五十九丸米飲淡醋湯任下專治婢妾氣鬱情
不宣通經多不調血氣刺痛腹脇膨脹頭暈惡心帶下便
血癰瘕或炒焦為丸善止血崩一方加當歸一兩艾葉四
兩名艾附丸○單香附散治胎前產後諸症香附米重便
浸晒畧炒為末每二錢白湯溫酒任下嘔吐泄瀉膨脹飲
食不化加砂仁三分或木香一分義木一兩檀榔各二分藿香
正氣散下吐痰噎食不下諸氣心腹小腹腰痛或結或閉

聚散無時加玄胡索砂仁各四分甚著加莪朮姜黃才香
各二分一應頭痛腦眩加川芎五分茶清下產後惡露不
下臍腹作痛或胎衣不下甚則衝心迷悶加莪朮玄胡索
五靈脂香附木香各七分五續散下○抑氣散香附四兩
茯神甘草各一兩陳皮二兩為末每二錢沸湯調服治婦
人氣盛於血變生諸症頭暈腦滿○墨附丸四製香附一
斤淨綿芰四兩用醋一碗煮二味至乾入石臼內搗爛埋
成餅子於新瓦上焙乾入白茯苓當歸人參川芎熟地徽墨
火煨紅醋淬各一兩木香五錢為末醋糊丸梧子大每七
八十丸酒下治婦人久無子而經水不調及素墮胎者亦
効○百子附帶丸四製香附十二兩阿膠艾葉四物湯料
各二兩為末用陳石榴一枚連皮搗碎煎水打糊丸梧子
大每百丸空心淡醋湯下調經養血安胎順氣胎前
產後及月事參差有餘不足諸症悉治久服有孕

通經

導經地黃養陰抑陰或滋陰

通經丸川椒莪朮乾漆當歸
青皮乾姜大黃桃仁紅花桂

心各等分為末用一半和醋熬成膏調餘藥為丸梧子大
每五十丸空心醋湯溫酒下治經候不通臍腹疼痛

成血痕。○導經丸。卽四物湯加官桂、桃仁各一兩、木黃、
兩血竭二錢半、紅花少許、地鷄廿一箇爲末、蜜丸、梧子大、
每五十丸、量虛實加減、空心酒下、治經候不通、臍腹連腰、
腿疼痛。○養陰栢子丸。栢子仁、牛膝、卷柏各五錢、澤蘭葉、
續斷各二兩、熟地三兩爲末、蜜丸、梧子大、每卅丸、空心米、
飲下、治血虛經少或閉、皮熱骨疼、癰瘦脈數。○抑陰地黃、
丸。赤芍一兩半、地二兩、北胡黃芩、秦艽各五錢爲末、蜜丸、
梧子大、每卅丸、空心烏梅煎湯下。○柴胡抑肝湯。柴胡二、
錢半、赤芍、牡丹皮各一錢半、青皮二錢、連翹、生地各五分、
地骨皮、香附、蒼朮、山梔各一錢、川芎七分、甘草三分、神麴、
八分、空心臨臥水煎服。治寡居獨陰、寒熱類瘧等症。○滋、
陰百補丸。益母草半斤、當歸六兩、川芎熟地、白朮各四兩、
芍藥三兩、人參、茯苓、玄胡索各二兩、甘草一兩、四製香附、
一斤爲末、蜜丸、梧子大、每五十丸、空心砂仁煎湯下、治勞、
傷氣血不足、乍寒乍熱、心腹疼痛。乾漆牛膝萬痛立止。萬痛、
痛不思飲食、疝、羸乏力等症。乾漆牛膝各一兩、爲末、用生地黃汁一碗、調勻、入磁器內、慢、
火熬至半乾爲丸、梧子大、每廿丸、空心米飲溫酒任下、痛。

去止藥治月經瘀閉繞臍寒疝痛微
及產後血氣不調腹中癥瘕等症
烏賊蘭茹兩鼻聞馨

烏賊丸烏賊魚骨四兩蘭茹一兩為末雀外清加小豆大

每五丸至十丸鮑魚煎湯下以乾物壓之利腸中也治少

時脫血或醉入房以致血竭肝傷胃膈支滿妨於飲食食

至先聞腥臊臭氣唾出清液或前後泄血月事衰少不來

兼治男子精竭陽事痿弱面無精彩病名血枯蒼葦子宮痰濕堪理

黃芩二兩為末蒸餅丸梧子大姜湯下調中散鬱一方加

半夏等分名中和丸治濕痰氣熱○清海蒼葦丸南星蒼

朮川芎香附作丸服之治肥人痰多占烏藥湯血海疼痛

佳血海地位因而下多者日必漸愈

能禁木香甘草各五分空心水煎服當歸散桃仁散經

行湛蠲當歸散白木五錢黃芩山茱當歸川芎白芍各一

兩冷酒煮去芩加肉桂為末每二錢空心酒下日三

服治經脉過期不勻或三四月不行或一月再至以致腰

腹疼痛○桃仁散桃仁甘草半夏澤蘭葉牛膝當歸桂

牡丹皮人參蒲黃川芎各五分赤芍生地各一錢姜煎
治月水不調或淋瀝不斷斷後復來狀如瀉水或前或後
或閉不來四肢沉重欲眠不寧歸丸桑皮散水腫侵尋
能飲食腹中堅痛多思酸物
九當歸人參太黃桂心瞿麥赤芍白茯苓各三兩芎藭一錢
為末蜜丸梧子大每十五丸空心米飲下桑皮散桑白
皮郁李仁各一錢赤茯苓二錢木香防己太腹皮各五分蘇
子木通檳榔青皮各七分半姜煎服治脚氣感發兩脚浮
腫小便赤澀腹脇脹
滿氣急坐卧不得
血風疼痛芎藭人參荆芥穗散川芎

一錢羌活枳殼甘草各五分赤茯苓芍藥酸棗仁桂心當
歸木香牛膝各一分姜煎熱服治血風身體骨節疼痛心
膈壅滯不思飲食人參荆芥散人參荆芥生地北胡鱉
甲酸棗仁枳殼羚羊角白朮各七分半桂心川芎當歸防
風甘草各五分姜煎熱服治血風體痛頭昏目眩心忪煩
渴寒熱盜汗頰赤口乾痰嗽胃滿或月水不調脘腹疼痛
痲痺塊硬或產後瘦弱症孕婦禁服
香沒藥白芍當歸各六錢虎骨五錢水蛭麝香各二錢為

末酒糊丸菜豆大每二錢空心酒下治寒濕相搏血滯經絡痛甚

耳心

柴胡調經湯羌活蒼朮各一錢獨活葉本升麻各五

熱服取微汗治經水色鮮不止頭項脊骨強痛不思飲食

○烏頭丸烏頭一兩芫花乾姜各五錢俱醋煮乾再入桂

心天麻海桐皮黑豆各三錢為末另用黑豆煮爛搗藥為

丸梧子大每七丸至十九丸黑豆淋酒下忌一切毒物治血

風走注攻刺半身不遂麻痺痿痺急風口眼喎斜語言寒

澁手足拘攣○卓蒼耳散用嫩蒼耳草心陰乾為末每一

錢溫酒調服治血風攻血氣乾癢大黃為血竭單大黃膏

注頭旋倒地不知人事

膏錦紋大黃四兩酒浸焙乾為末用醋一碗熬成膏丸如

鷄子大每一丸臨卧熱酒化下大便通利紅脉自下此治

乾血氣調經仙藥

也一方加香附子冷熱癆代四物以丹參單丹參散丹參

調服治經脉不調產前胎動不安產後惡露不下腰脊疼痛骨節煩疼

地黃交加血積化水

交加散生地一片生薑十二兩各錫自然汁以生地汁洗
生薑查生薑汁炒生地查置乾焙為末每三錢酒調服治
胎前產後百病榮衛不通經脈不調腹中撮痛氣血多少
結聚為癥產後中風不能轉側尤妙尋常腹痛亦宜一方
加玄胡索當歸川芎白芍各二兩人參桃仁各一兩半沒
藥木香各一兩香附半片為末醋糊丸梧子大每五十丸
空心姜湯下名交加地黃丸治
經水不調血塊氣痞肚腹疼痛在松存性經閉如瘀散在
松即至逆土牛膝當歸尾各等分瓦上焙焦存性為末先
一日白水調服七分五更再進一服即通治經水三年不
行者琥珀調經有種琥珀調經丸香附米一斤分作二分用
童便米醋各浸九日相淨艾綿四兩拌
勻再醋五碗入砂鍋內同煮乾為度入川芎當歸芍藥
熟地生地沒藥各二兩琥珀一兩為末醋糊丸梧子大每
百丸空心艾醋湯下治婦
人胞冷無子能令經正
蘇斯求嗣可枕各藥半夏茯苓杜
仲厚朴當歸秦艽各二兩防風肉桂乾姜牛膝沙參各二
兩二錢細辛人參各四錢為末蜜丸梧子大每廿五丸酒

下經調受補者服七日即交合孕後忌服

崩中漏下 膠艾當歸龍骨

膠艾四物湯阿膠艾

葉常歸川芎甘草各四分芍藥熟地各八分水酒各半空心煎服治勞傷氣血月水過多或崩漏不止及雄娘胎氣不安或因損動漏血傷胎者亦宜○當歸龍骨丸當歸芍藥黃連槐子艾葉茯苓各五錢龍骨黃柏各一兩木香二錢半為末水丸小豆大每五十丸米飲下治月事失常經水過多及赤白帶下淋瀝雄娘胎動不安疼痛漏下產後惡露不止大人小兒痢疾亦宜**有氣有熱香附橘歸黃芩** 備金散香附四錢五靈脂一兩為末每五錢淡醋湯調服治血崩不止○古橘歸丸橘皮四兩當歸二兩為末蜜丸梧子大每五十丸酒下治婦人肌膚手足俱有血絲露此怒氣傷肝血失常經故也一方加玄胡索治室女氣血相搏腹中刺痛引心或經行澁少或經事不調○單參心丸條參二兩用醋浸七日炙乾又浸又炙如此者七次為末醋糊丸梧子大每七十丸酒下治天暫澁靈脂散名紗帽散一味炒

烟盡為末，每一錢溫酒調服。治血崩諸藥不能止及男子
脾積氣，兼解藥毒。如產後惡血未淨，水酒童便各半煎服。
或心腹脇肋痛不可忍，只用童便煎服。中風加草烏五分。
同煎，腸風下血，用烏梅、柏葉煎湯調服。如心煩口渴，加蒲
黃或畏此藥氣者，燒灰服之尤妙。如蛇蝎蜈蚣咬塗傷處
立愈。○烏紗帽散：漆紗頭巾取，陽氣上行也。赤芍、香附、乾
荷葉、男子髮、常歸、棕櫚各等分，並於新瓦上焙存性為末。
每五錢童便調服。如人行十里，久再進一服。即止。如產後
去血過多，加米醋。
內補養榮丹號女金
京墨、麝香少許。

姜川芎、甘草各四兩，白朮、吳黃各二兩，肉桂、附子、白芍各
二兩，蒲黃八錢，熟地五錢，為末，蜜丸，梧子大，每五十丸溫
酒下。治氣血俱虛，月水不調，或崩中漏下去血過多，肌體
羸瘦。及月水將行，腹腿重痛。○加味養榮丸：當歸、熟地、白
朮各二兩，芍藥、川芎、黃芩、香附各一兩半，陳皮、貝母、茯苓
麥門冬各一兩，阿膠七錢，甘草五錢，黑豆炒去皮，四十九
粒為末，蜜丸，梧子大，每七八十九，鹽湯溫酒下。治經脉
瘀前久，朝內煩咳嗽，飲食減少，頭昏目眩，帶下血風，血

久無嗣息一切痰火不受峻補等症服之有孕又治胎前
胎動胎漏常服可無小產之患忌食諸血○女金丹白芍
當歸川芎人參白朮茯苓藁朮白芷白薇桂心玄胡索牡
丹皮赤石脂各一兩俱酒浸三日晒乾沒藥甘草各五錢
香附一斤醋浸共為末蜜丸梧子大每五十九溫酒下治
婦人無子或無痰火等疾經事亦調顏容不衰但久無孕
乃子宮有陰無陽不能生發宜服此藥動微陽二月即效
或有經事參後赤白帶下崩中淋瀝及積年血風手足麻
痺半身不遂或血氣心腹疼痛脾虧飲食無味面色萎黃
常作吐逆泄瀉及驚然中風浮腫瘡疥消渴一切虛勞等
症臨產艱難及死胎為丸彈子大用蜜湯化下產後瘀血
眩暈寒熱頭痛無所不治用淡醋湯送下真女中金丹也

帶下 濕熱 樗皮 加以 蒼柏 側柏 芥柏 芥米 不論 赤白

丸 蒼朮 黃柏 樗皮 海石半 夏南星 川芎 香附 乾姜 各等分
為末 醋糊丸 梧子大 每五六十丸 白湯下 暑月 去姜 加滑
石 治肥人 白帶 是濕熱 ○側柏 樗皮 九 樗皮 二兩 側柏 芥
酒 蒸黃柏 黃連 各五錢 香附 白朮 白芍 各一兩 白芷 煨

性三錢為末粥丸米飲下治白帶因七情所傷而脈數者

○芩柏檮皮丸黃芩黃柏檮皮滑石川芎海石青黛當歸

芍藥各等分醋糊丸服治瘦人帶下多熱○芩木檮皮丸

黃芩白朮各三錢檮皮白芍山茱萸各二錢半白朮黃連

各二錢黃柏一錢半為末酒糊丸溫酒下治孕婦白帶○

芩木芍藥丸白朮二兩黃芩五錢紅白葵花一錢半白芍

七錢半為末蒸餅丸煎四物湯下治結痰白帶○龜柏姜

地丸龜板三兩黃柏一兩乾姜炒一錢地子二錢半為末

酒糊丸白湯下治赤白帶下或時腹痛○蒼柏辛芍散蒼

朮黃柏辛黃川芎南星滑石半夏牡蠣酒炙水煎溫服治

婦人上有頭風

鼻涕下有白帶

帶下虛寒附桂煖宮補經固真平

兼治濁淫

附桂湯附子三錢肉桂一錢黃柏知母升麻

草各五分黃芪一錢半人參七分水煎服治白

帶腥臭多悲不寐太寒○煖宮丸當歸川芎白芍熟地茯

苓牡丹皮艾葉龍骨牡蠣赤石脂各等分麝香丸梧子大

豆五十九粒醋湯下治赤白帶下及子宮虛冷無子○若

練丸又名小煖宮丸若瘰癧肉小茴當歸各一兩為末酒糊

九、梧子大每五十九酒下治熱入大小腸赤白帶下。○補經固真湯柴胡黃芩郁李仁甘草各一錢人參乾姜各二錢橘皮五分白朮花一朵赤帶換紅葵花水煎溫服治始病崩中日久白帶下流不止。○東垣固真丸黃柏白芍各五錢柴胡白芍脂各一兩龍骨當歸各二兩乾姜四兩為末麴糊丸梧子大每十九白湯下少時以早飯壓之勿冷熱藥犯胃也忌生冷熱酒濕麴治白帶久下不止將腹冷痛陰中亦然日中溜火視物昏花齒惡熱飲此皆寒濕乘於胞內肝經陰火上溢故日中溜火其惡熱飲者陽明經中伏火也宜此丸大瀉寒濕。○平補鎮心丹茯苓茯神五味子車前子肉桂麥門冬各一兩二錢半遠志山藥天門冬熟地各一兩半酸棗仁二錢半人參砂砂各五錢龍齒二兩半為末蜜丸梧子大每卅丸米飲下治思慮太過心血不足或時怔忡常服安心腎益榮衛。虛火烏

鷄頭另饒虛滯烏鷄宜善擇

大烏鷄丸四製香附一片熟地四兩生地當歸白芍人參

各三兩川芎鱉甲各三兩半白木黃芪牛膝柴胡牡丹皮知母貝母各二兩黃連地骨皮乾姜玄胡索各一兩茯苓

二兩半秦艽一兩半爲末用白毛烏骨雄雞一隻開死去
毛腸淨用艾葉青蒿各四兩裝下半在雞腹內將雞并餘
艾蒿同入鑊內以童便和水浸過雞二寸許煮爛取出
骨焙乾爲末如有筋骨疼痛去肉用骨焙焦爲末與前未
和勻雞汁打稠在梧子大每五六十丸加至七八十丸溫
酒或米飲下忌煎炒葷菜治婦人羸瘦血虛有熱經水不
調崩漏帶下不能成胎骨蒸等症如月水先期加黃芩黃
連地骨皮月水後期加參朮黃芪白帶加一朮香附升麻
白芷柴胡其雞如得白絲毛烏骨崇冠者尤妙須另於一
處以黃芪炒末爲丸饒之不可近雌雞○小烏雞丸吳黃
良姜白姜當歸芍藥玄胡索故紙川椒陳皮青皮劉寄奴
生地莪朮川芎各一兩荷葉灰四兩北艾二兩爲末用烏
雞肉煮爛爲丸如未曾生育過者戶門油膜包裹子宮因
此不孕者宜加鳳凰衣燒存性七箇硃砂爲衣如腹痛血
黑色者加炒黃連有瘀濕加南星蒼朮香附同九梧子大
每五十九月水不通紅花蘇木酒下子宮久冷茯苓煎湯
下赤帶茶清下血崩漏淋瀝酒調綿灰下胎不安蜜酒下
血淋瀝飲調百草霜下小兒疳積清酒下漏胎下血烏梅酒

下耳聾腦茶清下胎死不動琥珀三箇煎酒下腰脚痛常
歸酒下胞衣不下芸臺菜研水下頭風薄荷煎湯下血風
服黑甘草煎湯下生瘡地黃煎湯下身體疼痛黃芪末調
酒下胎前產後白痢草姜煎湯下赤痢甘草煎湯下治氣
塊血塊作痛與葱白
湯間服百病醋湯下琥珀硃砂女子愛
四錢乳香一錢麝香硃砂各二分半為末水丸
如龍眼核大每用一九溫酒磨服治室女帶下白芷地榆
滑者欽白芷散白芷一兩海鯽鮓煨二箇胎髮燒灰一箇
為末每二錢酒調服治赤白帶下一方用白芷六
兩以石灰半斤淹三宿洗去灰將白芷炒焦入椒目四兩
或加黃根少許為末粥丸服治崩中白帶○單地榆散地
榆三兩醋水煎服治漏下五色一十二帶一曰多赤二曰
多白三曰月水不通四曰餘餘五曰子臟堅六曰子門碎
七日交合陰陽患痛八曰小腹寒痛九曰子門閉十曰子
宮冷十一曰夢與鬼交十二曰子臟不足兼治嘔吐下血

瘕瘕 緩治香附海粉連羅開鬱正元而已溫白琥珀暫服

香附丸 香附四兩 海粉 桃仁 白朮各一兩 為末 神麴糊丸
服 治婦人血塊如豆 有孕難服 絞藥 ○連羅丸 黃連一兩
半 用吳更益智各炒過 一半去更智 羅葡萄子一兩半 香附
山查各一兩 川芎 山施三錢 莪朮 神麴 桃仁各五錢 為末
蒸餅丸服 治婦人死血食積 痰飲成塊 在兩脇 動作雷鳴
嘈雜 眩暈身熱 時作時止 ○開鬱正元散 白朮 陳皮 青皮
香附 山查 海粉 桔梗 茯苓 玄胡 索神 麴砂仁 麥芽 甘草各
等分 姜煎服 治痰飲血氣 鬱結食積 氣不升降 積聚脹痛
宜此利氣行血和脾向導 ○溫白丸 皂角 巴霜 厚朴 吳更
紫苑 黃連各五錢 茯苓 人參 蜀椒 肉桂 乾姜 柴胡 桔梗 葛
蒲各一兩 川芎 二兩半 為末 蜜丸 梧子大每五丸 姜湯下
治心腹積聚 癥瘕大如杯碗 胃脇脹滿 及十種水氣痞塞
反胃吐逆並治 ○琥珀丸 琥珀 白芍 川芎 牛膝 鱉甲 莪朮
當歸 厚朴各一兩 木香 澤蘭 官桂各五錢 麝香五分 為末
酒糊丸 梧子大每七十丸 米飲下 治婦人血痕腹中直塊
攻刺小腹 痛重或腰背引為痛 久而不治 黃瘦羸乏 ○
古硝黃膏 朴硝 大黃各一兩 或入麝五
分 為末 用大蒜搗膏和勻 貼積塊處 効
癥瘕 猛攻 桃奴 桃

仁見明猪肝麝香而巳辰砂神聖代針桃奴散桃奴假犀

糞玄胡索肉桂五

麝脂香附各炒過砂仁桃仁各等分爲末每三錢酒調服
治血虛及瘀血停積經水不通男子跌損撲傷皆效○千
金桃仁煎先用醋二升半於磁器內慢火煎減一半入桃
仁大黃末各二兩煮末五錢於內不住手攪可丸時再
入甘硝末二兩攪勻取出如梧子大每五丸五更溫酒
下○日午瀉下惡物以盡爲度治經脉不通及血積癥瘕等
症○見見附子四錢昆龍箭羽紫石英各三錢澤瀉肉桂
玄胡索木香各一錢半水蛭一錢半槓榔二錢半
桃仁卅箇三稜五錢大黃二錢爲末酒糊丸梧子大每卅
丸溫酒下治石瘕狀如懷孕○猪肝丸用猪肝一具入
巴豆五十粒剉碎在肝內以醋三碗慢火熬令爛熟去巴豆
搗爛入三稜末和丸梧子大每五丸熱酒下治一切癥瘕
刺痛數年不愈者神效○麝香丹麝香當歸木香沒藥桂
心莪朮各五錢元花檳榔各一兩五靈脂桃仁三錢各三
分同麝一分爲末糯米飯丸梧子大每十丸姜湯下治瘕
癖氣聚在氣心腹痛不可忍○辰砂一粒丹附子鬱金

馬紅各等分爲末醋糊丸棗核大辰砂爲衣每一丸男酒

下女醋湯下服後又服神聖代針散治氣鬱心疾及小腸

膀胱疝氣痛不可止○神聖代針散乳香沒藥當歸白芷

川芎各五錢青紅蜻蛚去足翅一兩爲末每服一字甚著

五分先點好茶一盞次飲藥末在茶上不得吹攪立地細

細呷之治血積疝氣及心驚欲死小腸氣搐如角弓膀胱

腫硬一切氣刺虛痛并婦人血癖血迷血暈血如抱

刺驚心胞衣不下難產及一切痛疾服之神效鬼胎如抱

癰斑玄墜落抱癰丸芫花吳萸川烏秦艽柴胡姜蘇巴戟

下惡物立出巴豆各等分爲末蜜丸梧子大每七九蜜酒

貓玄胡索各等分爲末巴豆巴戟酒下以脂墜爲度治鬼胎感

於妖魅狀似癰瘰香乳香甘草各腫似稍箕四香伐侵

一切氣血痛亦効香乳香甘草各一分川芎胡椒陳皮人參白礬各五錢桂心乾姜砂仁茴

香各一兩太加焙五兩爲末每二錢陳米飲調服忌羊肉

治脾氣血氣血蠱

安胎束胎茶歸芍常用安胎當歸湯

氣血蠱水蠱石蠱

當歸川芎各

八分人參阿膠各六分棗子艾葉水酒煎服治舉動驚悸胎動下墜腹痛下血○古杜續丸杜仲續斷各二兩為末棗肉九梧子大每卅九米飲下治胎動腰痛宜此防其欲墮○東胎丸黃芩二兩寒月減五錢白米二兩陳皮三兩茯苓七錢半為末粥九梧子大每三四十九白湯下八箇月可服○古芩朮湯子芩二兩白朮五錢水煎服一方用芩朮等分為末粥九梧子大每五十九白湯下名安胎丸治四五月常墮不安內熱其故也古方一白用烏雞三個月用赤雄雞三個月用豬腰子餘月用鯉魚煮汁煎藥尤妙○金匱當歸散黃芩白朮當歸川芎白芍各一兩為末每二錢酒調服或酒糊為丸茶清下此方養血清熱孕婦宜常服之如瘦人血少有熱胎動不安素魯半產者皆宜服之以清其源長胎瘦胎歸地枳甘並行川芎阿膠生地各而無後患也六分當歸一兩牡蠣二分川椒三分為末蜜丸梧子大每卅九米飲下治孕婦宿有風冷胎寒不長或將理失宜傷動胎氣多致墮常服益血保胎調補衝任瘦胎枳甘散枳壳五兩粉草二兩半為末每二錢白湯點服或加赤

附一兩九妙治八九箇月內胎氣壅滯常宜服之

產益血舒氣若稍弱者恐致胎寒腹痛胎弱多驚當佐以

歸地木香為丸用之則胎漏者膠艾補中止血

陰陽調和有益胎嗣

艾葉二兩水煎服治跌撲傷損動胎或胎上搶心腹痛下

血膠艾芍藥湯阿膠艾葉川芎當歸各一錢甘草二分

水煎服治胎動不安或下血在八九箇月內少加砂仁

芎歸補中湯川芎當歸赤芍芍藥白木各七分阿膠五味

子乾姜各四分人參杜仲甘草木香各三分水煎服治胎怯者

服治氣血虛弱胎漏不能榮養以致數月而墮

參朮益氣救生益氣救生散人參白朮陳皮訶子神麴各

宜瘦胎合服此藥惡阻旋覆胎自保

安胎益氣易產錢厚朴白朮枳殼黃

芩茯苓各三錢芍藥半夏麴生薑各二錢水煎服忌葷腥

錫醋生冷治孕婦六七月間胎動惡阻嘔逆酸水惡食多

臥保胎飲當歸川芎芍藥熟地半夏茯苓甘草白朮黃

芪阿膠艾葉地榆各七分姜煎服治胎動不安腹腸疼痛

或時下血及惡血
一切等症並治
瘧疾厚朴脾能醒
醒脾飲子厚朴草豆
寇各五錢乾姜四分

甘草一分黃芩前服治子瘧子痢口淡及魚
傷風冷兼治老人氣虛便閉少津液引飲
子痢芎活

羊角湯治羊角獨治酸棗仁五加皮各五十分薏苡仁防風
當歸川芎枳椇杏仁各四分木香甘草各二分半姜

煎服治婦中風頭暈強直筋脉拘急言語蹇澀痰涎不
利或時發搐不省人事各口口子癰○古芎活散川芎羌活

各等分木煎入酒少許溫服胎
前安胎產後逐惡血下血木
子氣防已天仙藤防已散

錢桑白皮赤茯苓紫蘇各二錢木香五分姜煎服治妊孕
腫痛喘促小便不利○天仙藤散天仙藤即青木香藤香

附烏藥陳皮甘草各六分姜煎入紫蘇木瓜各三片同煎
日三服腫消止藥治孕婦兩足漸腫以致脚悶飲食不美

甚則脚指間有黃
水出名日子氣
臨產芎歸黑神來甦無憂橫逆
古芎歸湯川芎

當歸各二錢水煎入酒溫服治胎前產後腹痛體熱頭疼
諸疾及男子一切去血尤宜如孕婦因事染毒着胎或子

死腹中惡露將下疼痛不已口禁欲絕者用酒煎甘草再入水煎一二沸灌以探之若不掇則痛止不母俱安若胎特立便逐下如難產倒橫子死腹中先用黑豆炒熟入白水

童便各一盞藥四錢煎服如胎產五七日不下垂死及矮石女子交骨不開者加龜板并生育過婦人頭髮燒灰為末每三錢酒調服古黑神散百草霜白芷各等分為末

每二錢水煎入童便米醋少許調服治橫生逆產瘦胎及胎前產後虛損月水不止崩漏等症來甦散木香神效

陳皮麥芽黃芩阿膠白芍各一錢芩根甘草各二錢糯米一合半氣弱加生薑煎抗口灌之連進為妙治臨產用力

太過氣味衰微精神困倦頭眩目暈口噤面青髮直不省人事無憂散當歸川芎白芍各一錢枳殼五分乳香要

灰各三分木香耳草各一分半水煎服治胎肥氣逆或人瘦血少胎弱臨產難生催生三退六一

返魂兔腦神靈三退散蛇退一條蟬退十四枚男子頭髮

逆難產子死腹中三退六一散益元散一兩男子髮一

團用香油熬化蛇退一條蟬退五枚穿山甲一片各燒存

性為宋用蒸水煎二沸入麤灰拌勻服之催生神效
鬼丹即單益母膏丸端午日採紫花方莖者連根洗淨於
石臼內搗爛以布漚取濃汁入砂鍋內文武火熬成膏如
砂糖色為度磁罐收貯每服一匙或陰乾忌鉄為末蜜丸
彈子大每服一丸照後湯使下一方用益母草半斤加當
歸赤芍木香各二兩為末蜜丸梧子大每五十九丸白湯下
名加味益母丸服百日有孕催生用童便下如胎前臍腹
刺痛胎動不安下血不止米飲或秦艽當歸煎湯下胎前
產後臍腹作痛作聲或寒熱往來狀如瘧疾者米湯下臨
產并產後各先用一丸童便入酒下定規晚血氣自然調
順諸病不生又破血痛養胎自調經功効不能盡述產
後胎衣不下落在胞中及臨產一切產難橫生不順死胎
經日不下脹滿腹中心悶心痛妙蓋湯下產後中風牙關
緊急半身不遂失音不語童便入酒下產後氣喘咳嗽胃
膈不利惡心口吐酸水面目浮腫兩脇疼痛舉動失力者
溫酒下產後太陽穴痛呵欠心怔氣短肌體羸瘦不思飲食
血風身熱手足頑麻百節疼痛溫米飲下產後眼目黑
暗血暈血熱口渴煩悶如見鬼神不省人事薄荷自然汁

或薄荷煎湯下或童便酒各半下產後面垢煩赤五心煩
熱或結血塊臍腹奔痛時發寒熱有冷汗者童便入酒或
薄荷湯下產後惡露結滯臍腹刺痛惡物上衝心胃滿悶
及產後未經滿月血氣不通咳嗽四肢無力臨牀自汗不
止月水不調久而不治則為骨蒸之疾或鼻衄口乾舌黑
俱童便入酒下產後二便不通煩燥口苦薄荷湯下產後
痢疾米湯下產後漏血棗湯下產後赤白帶膠艾湯下血
崩漏下糯米湯下勒乳痛或成癰為末水調塗乳上一宿
自瘥或生搗敷亦好婦人久無子溫酒下服至一月決有
效驗○兔腦丸兔腦髓一枚鼠肉腎母丁香益母草
各一錢乳香一分麝香一字為末兔腦或兔血和丸茶實
大硃砂為衣油紙封固陰乾每一丸破水後醋湯或赤小
豆煎湯下即產隨男左女右手握藥出是驗凡產難日久
水乾服黑神滋藥又多最宜兔腦滑之倉卒以免皮毛燒
灰酒調服方寸匕亦好又能下胞衣○龜壳散龜壳一箇
生過男女婦人頭髮一握燒存性川芎當歸各一兩為末
每二錢水煎服良久生胎死胎俱下治產死胎霹靂如聖
五七日不下垂死及矮右女子交骨不開死胎霹靂如聖

靈應丹 蛇退 一條蠶退 二錢男子 髮路上左脚草鞋各一
錢各燒存性乳香五分黑鉛二錢半水銀七分半為末用
積猪心血和丸如梧子大金銀箔七片為衣每二丸倒流
水灌下或入伏龍肝調下土着兒頭戴出為妙治臨產驚
然氣痿目翻口禁面黑唇青口中沫出子母俱損兩臉微
紅子死母活○如聖膏巴豆十六箇草麻子四十九箇麝
香二錢共搗如泥難絹帛上如胎死腹中貼臍上一時產
下即時揭去如胞衣不下貼脚心胞衣下即洗去若稍遲
腸便出即移此膏塗頂上即入○古桂香丸肉桂下兩麝
香一錢為末飯丸菜豆大每十五丸小兒七丸百湯下治
大人小兒過食瓜菓腹脹氣急一方
戒桂五錢加琥珀一錢半善下死胎 胞衣奪命流形 奪命
黃附子牡丹皮乾漆各等分醋煮大黃膏為丸梧子大每
十五丸至廿丸溫酒下治產後血入胞衣脹滿衝心久而
不下或去血過多肺氣喘促先取鞋底炙熱熨小腹次進
此藥○奪命丸牡丹皮桃仁茯苓赤芍桂心各等分為末
蜜丸彈子大每十九醋湯化下或葱白煎
濃湯下九妙連進兩丸胎死腐爛立出 產後補虛當歸

羊肉內灸睨院

補虛湯人參白朮各一錢當歸川芎黃芪

切雜病只大補氣血為主如熱輕者倍加茯苓參之煎甚

有加炒黑乾姜引藥入肝分生血又能利肺氣與補陰藥

同意魯誤服熱藥及熱食者少加酒芥散服○人參當歸

散當歸熟地白芍人參麥門冬肉桂各一錢先以梗米一

合淡竹葉十片水二盞煎至一盞去渣入煎藥并姜棗

煎溫服治產後去血過多血虛則內熱心胃煩滿吸吸短

氣白汗頭暈悶亂時轉甚○當歸羊肉湯人參當歸各

七錢黃芪一兩生薑五錢用羊肉一斤或代以猪腰煮清

汁五盞去肉入煎藥煎作水服早晚頻進治產後發熱自

汗肢體疼痛各日煮勞○羊肉湯精鴨羊肉二兩當歸陳

皮各一兩生薑五錢水煎入酒調服加葱鹽亦可治產後

腹中虛痛氣血不足羸弱力倦及冬月生產寒氣入於產

門膈下脹滿此寒病也○內灸散藿香葉丁香皮茴香肉

桂熟地各一兩半甘草白朮當歸山藥白芷各八兩薑本

乾姜川芎黃芪白芍木香各一兩陳皮四兩每三錢姜艾

煎服或為末溫酒調服治胎前產後一切血疾血崩虛僂

腹脇疼痛氣逆嘔吐冷氣凝積塊硬刺痛泄下清血或下
五色腹中虛鳴氣滿堅硬瀝血腰疼口吐清水頻產血衰
顏色青黃勞傷勞弱月經不調下血墮胎血迷血暈血痛
時發疼痛頭目眩暈惡血衝心悶絕昏迷惡露不止體虛
痰汁手足逆冷等症如產後下血過多加蒲黃惡露不淨
加當歸紅花嘔加生薑上熱下冷加荊芥○觀脫丸良姜
姜黃薑朮陳皮莪朮人參三棱各等分為末用蘿蔔煮
爛搗汁煮糊九梧子大每五十九蘿蔔煎湯下治產後血
氣衰弱飲食停積口乾煩悶心下疼痛產後血暈四味七珍清魂調經散
黃葵蘆白芩雄黃等分為末每用少許吹鼻是內服白薇
湯治產後血厥而胃○四味散當歸芍藥胡索血竭沒藥各
五分重使煎服治產後一切諸疾繞方分燒宜服如心膈
甚倍當歸氣悶需急倍玄胡索惡露不快倍血塊心腹
甚倍沒藥○七珍散川芎人參葛蒲生地各一兩防風辰
砂各五錢細辛一錢為末每一錢薄荷煎湯調服治產後
虛弱多致停積敗血閉於心竅神志不明又心氣通於舌
心氣閉塞則舌亦強矣故令不語○寧神膏辰砂乳香各

五錢酸棗仁人參茯苓各一兩琥珀七錢半為末煨心蜜子煎湯調服一錢或錢九彈子大薄荷煎湯化服一錢治失血過多心神昏悶言語失常不得睡卧清血散荆芥四兩川芎二兩澤蘭葉人參各一兩甘草八錢為末每二錢煎湯溫酒各半調停灌下治產後血暈昏不知人一單荆芥散一味焙乾為末每二錢黑豆酒調服治產後中風牙關緊急手足痙攣或麻油燈上燒焦童便調服治崩中不止○古荆歸湯荆芥當歸身尾各等分為末每服三錢黑豆酒調服或童子小便亦可治產後血暈四股強直或吹鼻中蒜竅一方用蜜丸或麝香丸如枳實子大每服五七十丸空心米飲下治產後神風不省人事口緊牙關緊急手足痙攣死角弓狀口吐涎沫亦治血暈四肢強直或塞心眼倒吐瀉欲死宜此清神氣通血脈其効如神○木調經散大豆一兩半炒去皮茯苓神一兩琥珀一錢為末每三錢濃煎烏豆紫蘇湯調服治產後血虛惡露未消穢氣未平敗濁凝滯榮衛不調陰陽相乘增寒發熱自汗腫滿

白薇黑龍鬱冒汗多便秘

白薇湯白薇當歸各六錢人參三錢甘草一錢半分二貼水煎

服治產後冒弱不食脉微多汗亡血發厥鬱冒等症○黑
龍丹當歸川芎半地良姜五靈脂各二錢細剉俱入砂確
子內紙筋益泥固濟火煨通紅候冷取出入百草霜一兩
硫黃乳香各二錢琥珀花蕊石各一錢為末醋糊丸彈子
大每三九炭火煨令通紅投入生薑自然汁內浸碎之以
童便合酒灌服治難產或胎衣不下產後血暈妄言見鬼
及血崩惡露不止腹痛血腫血風身桂心木槧血凝氣滯
熟頭痛類瘧一切危症服之神効

心疼

桂心湯桂心小草吳茱萸乾姜獨活熟地當歸白芍各
一錢身草細辛各三分水煎服治素有宿寒因產大

虛寒搏於血血凝不散上衝心之絡脉故作心痛木槧
湯木杏檳榔玄胡索金鈴子三棱莪朮厚朴桔梗川芎當
歸白芍黃芩甘草各等分水煎服惡露不斷烏金調酒或
治產後七情感傷血與氣併心痛

牡蠣

烏金散麒麟竭百草霜男子亂髮灰松墨煨醋淬鯉
魚鱗燒灰玄胡索肉桂當歸赤芍各等分為末每二

錢空心溫酒下治產後敗血不止淋瀝不斷臍腹疼痛頭
目昏眩無力○牡蠣散牡蠣粉川芎熟地茯苓龍骨各二

鐵續斷當歸文葉人參五味子地榆各一錢甘草五分分

二貼姜棗煎空心服治產後惡露淋瀝不斷心悶每氣四

肢乏弱不思飲食頭目昏冷熱諸淋白茅為君共茯苓白

重五心煩熱面黃體瘦湯白茅根五錢瞿麥白茯苓各三錢半桑子人參各一錢

一分半蒲黃桃膠滑石半夏各七錢半甘草五分紫貝一

箇煨石首魚腦砂二箇服分二貼姜二片燈心廿根水煎

服或為末每二錢木通煎湯下如氣壅木通橘皮煎湯下

治產後諸淋無問氣塞少乳漏蘆散漏蘆一二兩半蛇退服

冷熱膏石氣等淋氣塞少乳漏蘆散十條瓜蔓實十箇煨

存性為末每二錢酒調服仍食熱菱湯助之治婦人肥盛

氣熱壅塞乳汁不行或經絡凝滯乳內脹痛或作癰腫癰

欲成氣滯少乳湧泉名湧泉散瞿麥麥門冬王不留行龍

腰者氣滯少乳湧泉名骨穿山甲等分為末每二錢熱酒

下先食猪腰蹄菱後服此藥服後以瓶刮左右乳房○又

方王不留行白丁香漏蘆天花粉姜蠶等分為末猪腰蹄

煮汁下兼治乳癰瘻意婦性最險而驚陰道竭虧難成

脹痛及乳癰腫

及乳癰腫

幼科未載素問扁鵲始稱兒醫夾驚夾積是主出麻出痘

尤奇兒病與木科相同驚則利之涼之溫之辰

砂龍腦救急利驚丸天竺黃滑石各一錢半牛黃南星半

各三錢白附子薤黃山查各一錢半蟬退全蝎姜蠶各七

枚甘草已霜各五分麝香八分金箔卅片為末麪糊丸蘿

蔔子大分作五處用金箔硃砂滑石青黛雄黃各為衣每

一歲至三歲服五丸五歲至九歲服七丸十歲至十三歲

服十丸諸驚風薄荷煎湯下痰多用滑石為衣的食疾用

雄黃為衣的餘症白朮下治急驚風症并廿四驚水瀉痢

疾痰火腹脹食積諸般雜症服之有積則行有驚則利服

後宜服啓脾散○啓脾散蓮肉一兩白朮茯苓山藥神麪

山查各五錢人參猪苓澤瀉藿香木香當歸白芍砂仁各

三錢肉豆蔻三箇陳皮二錢甘草一錢驚風後加辰砂滑

石各二錢為末任意姜湯調服初生兒塗乳頭上服之百

病愈後俱用此藥調脾為主○大利驚丸南星二錢白附

子牙硝天麻五靈脂全蝎各一錢輕粉五分巴霜一字爲末糊丸麻子大每一丸薄荷生薑泡湯下治小兒驚風肚脹臍腫身體重着四肢柔直日夜多啼不能吮乳甚則發爲風搐及釣腸鎖肚撮口內氣引扁腸胃鬱結不通宜此正痰利驚○東驚丸青黛草龍膽各三錢鈎藤一二錢防風黃連各五分牛黃龍腦麝香各一字爲末糊丸粟米大每一三五丸金銀煎湯下治驚熱胎驚發搐心神恍惚牙關緊急上視翻熱手足動搖握拳抽掣○小東驚丸鬱金二箇用皂角水浸黃連牙硝木香藿香龍膽草各五錢全蝎六箇爲末糊丸麻子大雄黃麝香硃砂金銀箔爲衣每五七丸風痰驚熱用麻仁防風蟬退潮熱桃柳枝真驚薄荷燈心夜啼聲心薄荷電心土盤腸鈎氣天鈎鈎藤吐瀉香瀉木瓜陳皮白朮白姜粟壳赤朮甘草烏梅太便開枳壳枳黃咳嗽烏梅桑白皮吐不止丁香末効黃荆葉精神不爽冬瓜仁常服金銀薄荷俱煎湯下治驚熱恍惚四肢抽掣潮熱昏迷不熱乍醒或爲驚恠所觸而致陽症驚癇○溫驚丸人參辰砂赤石脂茯苓各五錢白朮一兩山藥二兩乳香廣香各二錢爲末蜜丸芡實大每一丸薄荷煎飲化

下治胎寒腹痛乳便青乳食不化○大溫驚丸人參茯苓白朮辰砂麥門冬木香代赭石各五錢甘草酸棗仁各一兩姜蠶結梗各一錢半五箇金銀箔各六片爲末蜜丸棗煎大單兒大小服之急驚潮熱薄荷竹茹慢驚冬瓜仁夜啼驚心土搐驚防風傷風荆芥疹痘蟬退常服金銀薄荷俱煎湯下治心熱煩燥夜啼常用安神定志去驚如驚風已退神志未定者加琥珀遠志○珠銀丸水銀蒸棗肉研如泥全蝎各一錢白附子一錢半南星硃砂片各一字木槲子牛黃犀角麝香各半分鉛霜五分和米銀研去蠶七箇末粟米糊丸芥子大每下九薄荷煎湯下利去胎中毒爲度未利再服治小兒臍風口緊眼翻下切胎毒瘡疥癩癰亦治驚積宜量用之○辰砂膏辰砂三錢硃砂馬牙硝各一錢半玄明粉二錢全蝎真珠末各一錢麝香一字爲末油紙封裹自然成膏每取一二豆許金銀薄荷煎湯下潮搐耳草煎湯下月內兒乳汁調敷妳上令吮之治口緊眼閉啼聲漸小舌上聚肉如粟米狀吮乳不得口吐白沫二便皆通○辰砂化痰丸辰砂枯礬各五錢南星一兩半夏麩三兩爲末姜汁煮麩糊丸梧子

大另用辰砂爲衣每十九丸姜湯下亦治風壅小兒痰嗽生
姜薄荷煎湯化下一丸治風化痰安神定志利咽膈清頭
目止咳嗽除煩悶○龍腦安神丸茯苓三兩入參地骨皮
甘草麥門冬各二兩桑白皮犀角各一兩牛黃五錢龍腦
麝香各三錢硃砂牙硝各二錢爲末蜜丸彈子大金箔十片
爲衣每一丸冬月溫水夏月冷水化下小兒量服之
治五種顛癇發作無時及虛勞發熱咳嗽語澀舌強○金
箔鎮心丸全蝎七箇用薄荷葉包縛慢火炙乾天麻防風
羌活牛黃赤茯苓犀角甘草辰砂麝香各一錢爲末蜜丸
皂子大金箔廿片爲衣每一三丸薄荷煎湯化下鎮心解
熱退驚安神除煩燥止夜啼○天麻防風丸天麻防風人
參各一兩全蝎七箇姜蠶粉草各五錢雄黃硃砂各二錢
半牛黃一錢麝香五分爲末蜜丸梧子大每一丸至二丸
薄荷煎湯化下治撮口疳風及一切驚風身熱多瞞驚悸
手足搐掣精神昏憤痰涎不利及風濕邪熱並宜一方去
牛黃用入參或冬瓜仁煎湯下治慢驚不省手足微動眼
上視昏瞤○轉驚丸人參防風白附子姜蠶全蝎各一錢
南星天麻各二錢爲末麝香糊丸梧子大每一丸姜湯下

治小兒脾氣虛弱泄瀉瘦怯冷痺洞泄積則消之化之下
及吐瀉久病轉成慢驚身冷痙瘓等症

之紫霜白玉攸宜

消積丸丁香砂仁各十二箇烏梅肉巴豆肉各三箇史君子五箇為末煎丸

子大每三九橘皮煎湯下治乳食傷積心腹脹滿氣急壯熱或嘔或瀉○木香丸木香莪朮砂仁青皮硃砂代赭石

各二錢丁香巴豆肉各一錢為末飛麝香丸麻子大每三

九乳積乳汁下食積米飲下後與大異香散氣積橘皮煎

湯下後與流氣飲子○紫霜丸代赭石赤石脂各一兩杏

仁五十粒已電甘草為末蒸餅丸粟米大每三九或十九

量兒大小米飲乳汁任下以和為度未利再服治食積腹

脹身軟腰痠腹脹宜先用此取積止不虛人又治變蒸發

熱不解并治傷寒壯熱汗後不解及乳哺失節胃有痰癖

宿食乳則乳吐先寒後熱或內挾冷食大便酸臭兼驚

積丸兒有熱不欲飲乳漲胃不寧此皆發癰之漸即以此

丸瀉之時間量與此裁其盛勢則無驚風釣癰之患○白

玉餅白附子南星滑石輕粉各一錢巴霜十九粒為末麝

香丸菜豆大捏作餅二歲一九五歲二九葱湯化下治腹

中有癖但飲乳嗽而生痰及急慢驚風癇瘵潮搐壯熱痰涎壅盛一方去粳粉南星白附子用半夏十二箇巴霜五
十粒滑石寒食麩各一兩水九姜湯下治脾氣不
足乳食不消吐瀉驚悸肝腹潮熱咳嗽痢疾等症

風寒感

傷寒活大青膏

活大青膏天麻赤茯苓各五錢羌活防

風各一錢半以硃黃水銀同研如泥次以餘藥同為末蜜

調成膏流九草子大每一丸煎薄荷湯化下治傷寒陰症

及脾虛生痰肝熱生風或吐瀉後成慢驚○大青膏天麻

青黛各一錢白附子一錢半蝎稍烏蛇肉各五分硃砂磨

香天竺黃各一字為末蜜調成膏每服半皂子大月中兒

糲米大煎薄荷湯化下五歲以上則其膏飲下治傷風發

熱熱則生風此為驚搐血氣未實不能勝邪故也大小便

調口中氣熱宜此發之○大黃九太黃一兩黑丑五錢川

芩五分甘草一分為末糊丸麻子大每一丸量兒大小虛

寒蜜湯下以微利為度治風熱內實口中氣熱大小便閉

飲水不止有

下症者宜服**痰喘咳嗽**葶半百部丸可為

葶半九葶慈黑
丑杏仁防己各

等分爲末，棗肉丸。麻子大，每五七丸。淡姜湯下。治乳食衝
肺傷風咳嗽，面赤身熱，痰盛喘促。○百部丸。百部、麻黃各
三錢，杏仁四十箇，爲末，蜜丸。皂子大，每
二三次，溫水化下。治感寒，聲微喘。

生犀紫陽連翹飲

能實。變毒諸熱。小生犀散犀角一錢，地骨皮、赤芍、柴胡、乾
葛各一兩，甘草二兩，每三錢水煎服。治骨

蒸肌熱，更甚者，頰赤口渴，胸熱盜汗，五心煩熱。○紫陽黑散
麻黃、杏仁各一兩，大黃五錢，俱燒存性，爲末。每丁字乳汁
調或水煎，拍兒於溫處連服。微汗身涼，即愈。治變蒸解
利熱氣。○連翹散。連翹、麥、滑石、車前子、牛蒡子、赤芍各
一分，山楂仁、木通、蟬退、當歸、防風各半，小黃芩、荆芥各一
分半，柴胡、甘草各二分，水煎服。即八正散加荵治小兒諸
熱，表裏俱宜。如風熱痰熱變蒸，熱肝熱大腸熱癰疹熱，加
麥門冬、用熱實熱血熱三焦熱小腸熱，加大黃、燈心、麻痘
熱溫氣熱已出未出症，熱加紫草、當歸、綠毒熱胎熱肺熱
傷寒後瘡疹後餘毒發熱，加薄荷、項上生核，熱癰癰毒
熱加、大黃、朴硝。○寬熱飲。枳殼一兩，水浸去穢，以巴豆四
十九粒同炒黃，去巴。大黃一兩，朴硝五錢，甘草一錢，爲末。

每三五分，清熱湯調服，當利下。如瀉涕或成塊，腥臭惡物，治小兒驚熱，天鈞手，足攣掇，肚腹有熱，兼治食積乳癖。
生痰
天乙
觀音銀白散
調虛弱
胃脾
天乙丸，燈心一丁片，以米粉漿洗晒乾，為末，入水澄之，將者為淨心，取出入藥二兩半，赤白茯苓，兼茯神共五兩，滑石、猪苓各五兩，澤瀉三兩，為末，用入參、丁、片、煎膏一丁方，用入參、白朮各六兩，甘草四兩，同煎膏和丸如龍眼大，硃砂為衣，金箔裹之，每一丸隨病換引化下。
大段小兒生，理本天一生水之妙，凡治病以水通利為捷徑也。此方清心利便，所以散火也。凡小兒蘊熱，丹毒驚風，痰熱變蒸，發熱之症，用之最當，而嘔吐瀉痢諸症無不治也。
○觀音散：人參一錢，薄荷肉神、麝各一丁分，茯苓一丁分，半白朮、黃芪、木香、白扁豆、甘草各一丁分，姜棗煎服。治外感風寒，內傷飲食，嘔逆吐瀉，不進飲食，久就羸弱。一丁方加防風、羌活、天麻、全蝎、各全蝎、觀音散治吐瀉後，慢脾風甚者，加川烏。
○銀白散：升麻、知母、山藥、白扁豆、人參、白朮、茯苓、甘草等分，為末，每一錢沸湯調服。治小兒百病，加歲由人，如慢驚，搗搗香飯湯下，急驚定後，陳米湯下，驚吐不止。

丁香煎湯下天桂膏倒脚軟濃米湯下夾驚傷寒薄荷煎湯下
白煎湯下疳氣肚脹氣急多渴百合煎湯下壯熱面赤驚
斗三銀薄荷煎湯下赤白痢不思食及諸病後倦怠不思
食姜棗煎湯下寒食下知饑飽不長肌肉麥芽生薑煎湯
下暴吐紫蘇木瓜煎湯下神形脫語言不正及大人吐瀉
霍亂香葉煎湯調服若稟受氣怯小兒可每日服一服最妙

消毒加地皮快斑透肌如四聖

消毒散鼠粘子八分
荆芥四分甘草二分

治症欲出未出已出壯熱未微咽痛緊便秘
一切瘡毒赤腫等症急進三四服快透消毒應手
効准內虛便利者忌用如虛熱加地骨皮壯熱加黃芩
紫草實者加生犀磨汁症已出未出或初起二三分出不快
及痒加蟬退有汗加防風或食加人參山查便秘加大黃
氣虛加參朮血虛加芎歸百脈加裁由入○快斑散紫草
蟬退人參芍药各五分木通二分甘草一分水煎服治症
出不快一方去木通加穿山甲等分治症已出被風復入
○透肌散紫草一錢升麻甘草各五分糯米五十粒水煎
服治症已發不快解毒清熱涼血加蟬退地骨皮酒蒸○

如聖湯白芍升麻乾薑各五分甘草紫草木通各二分半
 山查根二十姜葱煎熱服治瘡瘡已出未出身熱如火
 疼腫赤呵欠鼻瘡如心煩加麥門冬赤茯苓煩渴合生麻
 散身熱如火加酒淬地皮○四聖散紫草木通各一分錢
 壳甘草各五分水煎溫服治痘出不快及倒靨陷伏惡候
 毒氣入內腹脹弱赤如氣弱去枳壳加黃芪○加味四聖
 散紫草木通木香黃芪川芎甘草人參各等分蟬退或半
 每二錢水煎服治痘出不快及變陷倒靨小便赤澀餘熱
 不除一切惡候或痘出被風吹復不見入皮膚內發
 熱不散如便閉加枳壳便調加糯米能解毒發痘也痘出

解毒紫草活血勾氣勝萬金

解毒防風湯防風五分地

穗肩粘子各二分半水煎溫服治痘七日後排熱去毒氣
 弱痘出不快及痘出而聲又紫草食紫草一二兩片百
 沸湯一碗沃之以物蓋定勿令泄氣候溫量兒大小
 服出亦輕治痘出未出或痘一熱出齊服此重變輕
 便利者忌服或加陳皮葱白尤妙如發瘰癧加釣藤酒調
 服○紫草膏紫草白附子麻黃甘草各五錢全蝎甘草姜

蠶八箇蟾酥一錢爲末另用紫草一兩煎膏入煉蜜二兩
酒半盞攪勻和丸菜豆大每一丸治痘已出不快及驚風
癰疾如初發熱重者敗毒散化下初發驚狂者薄荷葱白
燈心煎湯下色紅紫黑隨紫草煎湯下色淡白灰暗熱酒
下○加味紫草散紫草白芍麻黃甘草各五分水煎溫服
痘出未透如年壯及北方皮厚之人加蟾酥辰砂蓋紫
草解毒所黃發汗固能發痘佐以辰砂解胎毒涼心火蟾
酥善祛臟腑毒氣從毛孔作臭牙出凡表實變出俱宜用
此四味如血風出不勻色不潤者加當歸○紫草木香湯
紫草木香人參白朮茯苓甘草各四分糯米廿粒水煎溫
服治痘出不快大使泄利蓋紫草能利大便故用木香白
朮佐之或隱或見皆加檀香○紫草木通湯紫草木通人
參茯苓糯米各四分甘草二分水煎溫服治痘出不快如
大便利者去紫草加木香○活血散赤芍歸尾紅花紫草
各五錢木香二錢血竭一錢爲末每二錢痘色淡白酒調
下熱極血焦不紅活紫草煎酒下○小活血散赤芍白芍炒
爲末每一錢出快溫酒下痘痛溫水下倒靨紫草煎湯入
酒少許調服大能活血止痛除煩如兩腳膝攣加甘草即

芍藥甘草湯也。○芍藥散即八味順氣散各五分甘草二分半木香一分半為末酒調服治氣滯痺出不快及肉腠厚密身痛。○疎氣散蒼朮白芷防風升麻黃芩白芍連翹歸尾各等分甘草節減半水煎服治氣實痰鬱發不出者。○連翹散連翹防風山柃甘草各一分水煎服治痘發熱不發。○萬金散防風二錢人參各一錢薄荷二葉水煎服或為末每二錢用開花蘿蔔煎湯調服取其發之義耳治痘已出未透色不紅潤實者加升麻。鼠

粘湯治稠密以防伏

胡黃芪連翹各等分水煎溫服熱

退即止治痘出稠密身熱不退宜急服此藥以防青乾黑腐

調解散醫水硬而為邪侵

青皮陳皮桔梗枳殼當歸牛黃川芎木通黃芩甘草紫蘇紫草各二分人參一分姜棗煎服治痘已發或為國冬所折榮枯不和或又為食所傷內氣壅遏以致水硬黑陷宜用此散

山柃猪尾無價

宣毒膏硃砂乳香各一兩馬牙硝甘草各五錢腦麝各一錢為末臘月八日取小法

橫猪尾血一盞和勻以新竹筒一箇盛之用綿紙數重封
口繫於大糞坑屋梁上至清明日取出晒乾更入腦麝各
一錢為末水丸皂子大每一丸人參煎湯化下治毒盛痘
出不快瘡黑倒靨神效○宜風散橫痃陳皮炙甘草各五
錢牽牛四兩為末幼者五分壯者一錢食前蜜湯調服治
痘青乾黑陷身不大熱煩渴腹脹而喘二便赤澀面赤悶
亂大吐瀉熱蓄於內當利小便不愈者宜服利後宜和脾
胃一單大戟丸又名百神丸紅芽木戟一兩用漿水煮極
熟入原汁中煮汁盡焙乾為末蒸餅丸粟米
入每二十丸研赤研湯下量兒大小服之治痘紫黑陷甚
寒戰緊口鼻閉身黃紫腫○山慈仁湯山慈仁白蘚皮赤
芍升麻各二分寒水石甘草各一分紫草薄荷各少許水
煎溫服治痘疹及斑毒狀如蚊咬發毒盛黑色○猪尾膏龍
腦一錢為末旋磨小法橫痃為丸小豆大每一丸煩
燥紫草煎湯下胎伏溫酒下或用猪心血為丸亦可治痘
出未透心煩狂躁氣喘妄譫便閉能食或已發毒盛陷伏
者宜此速治惟虛寒者忌用○無價四尿散人尿用無疾
童子者猪尾犬尿用未破陽雄者先於重九日各置淨處

饑之飯食勿令雜食至旬日換盡腸中宿垢方收其屎陰
乾候臘月八日日出時火煨烟淨白色為度但表虛痘
發不快倒騰黑陷及一切惡瘡每用一字蜜水調服其
效如神若緊急黑陷甚者只單燒人屎亦好黑陷人
齒痛齒牙蟬退穿山兔血難尋人齒散人齒脫者以砂
鍋因濟火煨通紅取出候
冷為末每三分或入麝香少許尤妙如痘出不快既出倒
騰不斂寒熱脉遲或服未藥過多溫酒下痘出色黑酒和
猪尾血下痘黑膿不出加赤小豆七粒薄荷泡酒下如七
日前黑陷屬新毒燈心煎湯下紫陷屬氣熱溫酒下血陷
屬血熱灰陷屬血寒俱酒入麝香下白陷屬氣寒當歸煎
酒下如黑陷甚者用人齒五分差者一錢穿山甲麝香各
少許為末每一錢麻黃薄荷煎湯調下一服便起凡人齒
不可過用一錢過則陽益出表陰盛裏寒必痘爛濡泄急
以四君子湯加芎歸救之○四齒散人齒蟬齒狗齒猪齒
各二錢半砂鍋因濟火煨通紅候冷為末每五分熱酒調
服治痘不紅不起發色灰白或黑陷而焦取效如神○單
蟬退湯蟬退廿一箇或加甘草一錢半水煎服治痘疹

出不透腹痛或痘黑靨或蘊積熱毒及風毒充於皮膚癢
痒不止發背癰癩夜啼寒熱不寧○用木散蟬退五分地
龍一兩為末每二錢研乳香湯下治痘瘡黑陷項強目直
腹脹喘急發盛連進二服而愈○獨聖散穿山甲取前足
及背上者炒為末每五分木香煎湯少入酒調下或入麝
少許尤妙如七日後黑陷紫草煎下紫陷溫酒下血陷
酒下○天靈散入麝香下白陷當歸煎酒下○天靈散
用天靈湯洗過晒乾天靈蓋三錢洗淨用薄荷三錢久令
黃白為末和勻臘月辰日取兔血或雞血為丸菜豆大每
一丸溫酒化下治氣血熱痘瘡外黑赤而內白陷者神
妙或只用藥末於發處示出時用紫草升麻紫蘇葱白煎
湯調下一分麥汁出痘亦稀但天靈蓋非燒化與至險不
可輕用用者常忌穢汚凡臍帶童便大穢牛糞之類非經
煨而用之不可

牛黃散牛黃丹目黃便閉而膿不乾

牛蒡子五錢姜糖二錢半入紫草三錢煎服治痘早發熱
晚大熱目黃脇動身熱手冷發甚如驚惟虛寒者忌用○

牛黃用牛黃一錢生大黃寒水石升麻各五錢粉霜粉砂各五分為末蜜丸黍米大每十九量兒加我人參或紫草薄荷煎湯下治痘出大便不通者中腹水不乾

雄白湯熱艾湯口渴下利而血相雜量兒大小服之以去惡積治痘疹身熱下利黃赤膿血

○三黃熱艾湯其艾黃連黃柏熟艾各等分水煎服或加糯米紫草甘草亦好治痘疹正出似收未收下利黃赤膿血身熱大渴宜

此湯以解其毒身熱經日喜一參二參湯柴胡麥門冬人參玄參甘草各等分

龍膽戕半水煎服熱退即止治痘壯熱經日不除胃冷吐瀉愛蘇葉胃受敵糯米

六箇木瓜三分藿香蘇葉甘草各一分為末每一錢或五分粟米煮子煎湯下治痘出嘔吐泄瀉煩渴胃中虛冷

應寧醫十男子莫醫一婦人寧醫十婦人莫醫一小兒寧

醫十小兒莫醫一老兒

癰疽 雖屬外科用藥却同內傷

凡癰疽皆飲食七情房勞損傷脾腎肝所致間有外

邪相搏及小瘡瘍傳染亦皆因內有毒以召之也是以薛

立齋專用補中益氣湯以補後天腎氣凡以補先天中

雜症氣用四君子血用四物湯痰用二陳湯替用錢龜丸

一同內科在初起內托內消和解消似傷寒故曰必通內

外與儒而後可托邪毒而不陷分經絡以用方腦背尻腎

言知外科也

黃連羌活 力厚 黃連消毒散黃連羌活各一錢黃芩黃柏

風歸尾連翹各四分黃芪蘇木陳皮澤瀉各二分人參耳

草各二分水煎服治足太陽經分癰疽發於腦項或背腫

勢外散熱毒飲麻木不痛宜先灸之或痛而發熱並宜

服之○內托羌活湯羌活黃柏各二錢黃芪一錢半防風

藁本扁尾各一錢連翹甘草蒼木陳皮各五分肉桂三分

水二盞酒一盞煎至一盞熱服治足太陽經分癰疽發於

尻臀堅硬腫痛大臂膊乳臂白芷升麻桂涼

白芷一錢半

升麻黃連各一錢甘草紅花各五分黃芪獨活各四錢生
芩三錢分二匙水酒各半煎服治手陽明經分臂上生癰
此得入風之變也○內托升麻湯葛根升麻連翹各一錢
半黃芪當歸各一錢各一錢鼠粘子五分肉桂三分黃柏
二分水二盞酒一盞同煎服治兩乳間出黑十味中和湯
頭蒼蒼頂陷下作黑眼子并乳癰初起亦宜

跌打於癰立側服石菖蒲牛蒡子羌活獨活防風漏蘆荆
芥麥門冬前胡甘草各等分水煎服治

手足少陽經分發癰及時八味逍遙散降火於手足少陽
毒癰云在半表半裏者

當歸芍藥茯苓白朮柴胡甘草各一錢牡丹炒山梔各七
分水煎服治脾胃血虛有熱生癰或遍身癢痒煩熱肢體
作癢頭目昏重或怔忡煩赤口燥咽乾口舌生瘡耳內作
痛或發熱盜汗食少嗜睡或胃乳腹脹小便不利或手足
少陽火盛內熱瞋熱月經不調寒熱往來或脇乳腫痛
耳下結核等症加頭目不清加川芎五分蔓荊子七分木

陰腿內膝足莖柴附子湯入酒內托莖柴湯黃芪二錢柴
胡一錢羌活五分連翹一

錢半土瓜根酒洗一錢歸尾七分半肉桂三分半生地黄柏
各二分分水二盞酒一盞煎熱服治足太陰厥陰經分瘡生
腿內近膝股或離或附骨疽初起腫痛勢大○附子六物
湯附子防已肉桂各一錢茯苓白米各七分甘草二分半
姜煎服治足太陰經流注四氣骨節煩疼四肢拘攣少陰腿
急自汗短氣小便不利手足或時麻腫兼治五痺

外臙脛內托黃芪酒煎湯

內托酒煎湯黃芪歸尾各二錢
柴胡一錢半連翹肉桂大力子

白芷各一錢升麻七分黃柏甘草各五分水酒各半煎服
治足少陰經分癰生腿外側或因寒濕得附骨疽或微侵
足陽明經分堅硬腫痛不能行○瀉心護心主痛拜
連黃芩山梔蒲黃澤

蘭連翹薤白各五分量虛實水煎服治癰疽瘡毒腫盛發
藥煩渴脉洪實而數○護心散菴豆粉四錢乳香一錢為
末甘草煎湯調時時細呷瘡已沈晦加肉桂二錢當歸一
錢煎湯調服治諸發背疔腫曾經汗下毒氣攻心迷悶嘔
吐喘嗽泄瀉而痛喉舌生瘡名曰心氣絕初起宜服此藥
最能反出毒氣不致內陷發後亦可間服此藥加山梔杞

皮末二錢又渴肝清肝肝主瘡瘍龍膽瀉肝湯龍膽草等
可外敷止痛

生地當歸皂山施黃芩甘草各五分水煎治肝經濕熱或

囊便毒下疳懸癰腫嫩作痛小便澀滯或婦人陰磨痒

痛或男子陰挺腫脹或出膿水○清肝湯川芎當歸各一

錢白芍一錢半柴胡八分山施炒牡丹皮各四分水煎服

治肝經血虛而有熱火○清肝解鬱湯當歸白朮各一錢

半人參柴胡牡丹皮陳皮川芎各八分茯苓貝母芍藥熟

地山施各一錢甘草五分水煎服治癰疽因肝經血虛風

熱或肝經鬱火傷血乳內結核或為腫潰不愈凡肝膽經

氣血不和之症並皆治之○清肝益榮湯白朮二錢熟地

一錢半當歸山施木瓜茯苓各一錢龍膽草八分川芎芍

藥柴胡各七分甘草五分水煎服治肝膽小腸經風熱血

燥筋攣結核或耳項胃乳脇肋作痛或作瘰癧并一切肝

火血症○梔子清肝湯山施柴胡牡丹皮各一錢茯苓川

芎芍藥當歸牛蒡子各七分甘草五分水煎服治三焦及

足少陽經血虛肝火風熱耳內作痒或生瘡出水或頭項

如作痛或寒熱加酒炒芩連燉連太陽或頭痛加羌活
柴胡清肝湯柴胡山梔各一錢半黃芩人參川芎各一錢
連翹桔梗各八分甘草五分水煎服治鬢疽及肝膽三焦
熱怒火以致頸項耳前後或胃乳脇肋作痛或嘔熱不
食寒熱往來嘔吐泄瀉等症惟未發爲氣血實與當奪泄以瀉其壅盛

內疎清熱消毒敗毒解毒打膿追膿潰膿善用
湯連翹二

內疎黃連
湯連翹二

錢大黃一錢半黃連黃芩山梔薄荷木香檳榔芍藥當歸
桔梗甘草各一錢水煎服量虛實用之治熱毒在臟癰疽
腫硬發熱嘔吐大便秘結脉洪而實屬純陽症下方去木
槓加金銀花牡丹皮○清熱消毒飲金銀花二錢芍藥川
芎生地各一錢半當歸黃連山梔連翹甘草各一錢水煎
服治癰疽腸症腫痛發寒發熱作渴等症○人參敗毒散治
一切癰疽嫩痛發寒發熱或拘急頭痛屬表症宜用○黃連
解毒湯治癰疽嫩痛煩燥飲冷脉洪數或狂言等症下方
見傷寒門○打膿散木鱉子虛者七箇實者九箇金銀花
黃芩黃連黃柏歸尾各一錢大黃二兩甘草節穿山甲各

七分芒硝三錢水煎五更服大便見膿小便見血為効治諸癰腫不放膿出○追膿化毒散穿山甲當歸木黃各二三錢玄明粉姜蠶乳香沒藥各一錢半白芷二錢水煎服并查治一切癰疽瘰癧便毒瘰癧火胃緊初起下以平之○潰膿散白芷上中二錢下二錢六分陰一錢四分穿山甲上三片中二片下陰一錢半乳香上一錢四分中九分下陰八分姜蠶上一錢中五分下一錢四分陰一錢二分甘草節上一錢六分中一錢四分下一錢三分陰一錢六分為末先以常歸煎酒并瘡洗過如瘡在頭心上者服四錢四分心膈中者服三錢七分腿足下者服三錢半肚腹內陰者服四錢半俱用水酒各一盞煎調前未通口盡服如不足好酒和之取利為度治癰疽發背疔瘡瘰癧對口乳癰男婦便毒魚口惟已發為榮衛薄歟當補托以接其虛怯已成未成皆効

托裏清中溫中和中建中抑青益黃益氣相當

托裏散人參黃芪各

二錢白朮陳皮當歸熟地茯苓芍藥各一錢半甘草一錢水煎服治癰疽氣血虛不能起發潰爛收斂或惡寒發熱

肌肉不生宜此補托如癰腫熱毒加黃連浸腫氣虛倍參
朮表邪加羌活川芎表虛倍參芪內熱飲冷便秘去參芪
歸朮加木黃內虛飲熱便秘倍參芪歸朮寒熱飲冷嘔泄
肝熱去參芪加柴胡炒山梔不作膿膿不潰氣虛也加參
朮桂腫赤作痛血凝滯也加乳香沒藥肉赤不斂血虛有
熱加熟地牡丹皮肉黑不斂陽氣虛寒也加參芪肉桂白
斂肉白不斂陽氣虛也膿多不斂氣血虛也俱倍參芪歸
朮漫腫不痛肉死不潰脾虛甚也加參朮姜附膿多帶赤
血虛也倍參朮歸地忿怒喘熱出血肝火血虛也加牡丹
山梔熟地面青脇脹出血肝虛不能藏也加山藥山茱萸
五味子食少體倦出血脾虛不能攝也倍參芪歸地鬱結
少寐出血加遠志酸棗仁茯神龍眼肉欬嘔作嘔或外搽
內服寒涼或痛甚或感外邪穢氣作嘔胃虛也加藿香參
朮少食腹痛腸鳴冷瀉脾虛寒也加炮姜木香膿多作瀉
氣血虛也加熟地五味子麥門冬並痛濁並精內敗也加
山藥山茱萸黃澤瀉勞後弱赤氣下陷也加升麻柴胡日晡
頭痛眩暈陰血虛也加熟地身熱惡衣或投水中脈沉微
細氣脫發躁也加姜附肉桂補熱多痰脾血虛也倍歸地

參朮善思體痛不寐盜汗脾血虛也加茯神酸棗仁寢寐
汗出腎氣虛也加五味子飲食汗出胃氣虛也加參朮五
味子勝覺飽而盜汗宿食也加參朮半夏婦人勞怒夜熱
或譫或適經行熱在血分也加柴胡生地牡丹皮○托裏
消毒散人參黃芪當歸芍藥白朮茯苓陳皮各一錢連翹
白芷金銀花各七分甘草五分水煎服下五去連翹加川
芎皂刺乳香沒藥治癰疽腫痛俱慢色不甚赤元氣虛弱
或行攻伐不能潰散者宜用之未成者消已成者潰又去
腐生新之良劑也加戒同煎但虛弱及已潰者去翹並金
銀花三味消毒之藥○托裏清中湯人參白朮茯苓陳皮
半夏桔梗各一錢甘草五分姜棗煎服治癰疽脾胃虛弱
痰氣不清飲食少思等症○托裏溫中湯附子四錢乾姜
羌活各三錢益智仁丁香沉香木香茴香陳皮各一錢甘
草二錢姜煎服治癰疽腸氣虛寒腸鳴切痛大便溏泄飽
逆昏憤此寒變內陷緩不可救○托裏和中湯人參白朮
茯苓陳皮半夏炮姜各一錢木香甘草各五分姜棗煎服
治癰疽中氣虛弱飲食少思瘡不消散或不腫痛或潰而
不斂等症○托裏建中湯人參白朮茯苓各二錢半夏炮

姜各一錢甘草五分姜棗煎服治癰疽元氣素虛或因寒

涼傷脾損胃飲食少思或作嘔泄瀉等症急服此藥以健

中氣○托裏抑青湯人參白朮茯苓陳皮半夏各一錢芍

藥柴胡各五分甘草三分姜棗煎服治癰疽脾胃虛弱肝

木所侮以致飲食少思或胃脘不利等症○托裏益黃湯

人參白朮半夏陳皮川芎香附山梔瘡木各一錢甘草五

分姜棗煎服治癰疽脾胃虛寒水侮土以致飲食少思或

嘔吐泄瀉等症兼治癰疽六腑所傷中氣虛弱食少等症

○托裏益氣湯白朮二錢人參茯苓貝母陳皮香附芍藥

當歸熟地各一錢桔梗甘草各五分水煎服治癰腫硬肉

色不變或補熱或潰而不斂并一切血氣內症如口乾加

五味子麥門冬寒熱往來加柴胡地骨皮膿清加黃芪腰

多加川芎肌肉遲生加白欬肉桂且夫腦疽最靈酒炒茶連各二錢

酒柏連翹防風羌活甘草山梔子各一錢獨活藁本各七

分澤瀉五分水浸良久入酒一匙煎熱服日二次三日盡

六服中將藥清汁調下木香檀榔末各二錢因膏梁熱醬者宜貧窮寒濕者少用頭瘡酒歸立化

酒歸飲酒當歸白朮各一錢半酒芍酒芍川芎陳皮各五分
分酒天麻蒼朮蒼耳各七分半酒甘草黃柏各四分防風
三分水煎日四五服服後蘊睡片時

瘰癧未被宜內消調經通經散堅軟硬

外敷調經湯升麻八分葛根草
龍膽黃連桂枝連翹酒芍酒柏

莪朮三錢牛草各五分歸尾芍藥各三分生黃芩四分稍
虛加夏枯草有痰加天花粉知母各五分少陽加柴胡四
分先用水浸半日煎熱服再用大料為末蜜丸菴豆大每
百丸服藥時足高去枕仰臥緩緩以前湯送下治瘰癧瘻
頸或至頸車屬足陽明瘡深遠隱曲肉底屬足少陰乃戊
胃傳於癸腎俱作塊堅硬大小不一並皆治之○柴胡通
經湯柴胡連翹歸尾甘草黃芩桑梔子三錢桂枝各二分
黃連五分紅花少許水煎熱服忌苦藥壯大便治少陽部
分項側有核堅而不潰各日馬刀二湯元氣無虧者可服
○海藻散堅丸海藻昆布龍膽草蛤粉通草貝母枯礬真
松蘿各三錢麥蘆四錢半夏二錢為末酒調服或蜜丸菴
豆大每卅丸臨卧蘊頭白湯下并含化燕之忌甘草魚鱉

猪肉五辛生冷治瘰癧馬刀堅硬形癰潮熱不食兼治一切瘰癧氣神效○瘰癧臭子九臭子一盞去粗皮黃心女參連翹各一兩水五盞煮乾揀乾者食後細嚼津嚥下破者每夜含化一丸半月即效未破者破已破者按易落不問遠年近日腫硬疼痛皆宜如體盛硬甚者子用礪砂醋煮全瘰癧少少服瘰癧多多服○必効散礪砂一錢半輕粉一錢麝香五分巴豆五箇橫切一箇瑛瑛四十分為末用鷄子二箇取清調勻復入壳內濕紙封固蒸熟取出為末虛者五分實者一錢五更姜酒調服如小腹作痛瀉粉片血子是毒出也若覺小便澀痛用益元散一服或毒從大便出尤快未下三日後再進一服以病根去盡為度如是患瘰癧宜此劫之○立應瘰癧連翹赤芍川芎當歸甘草薄荷石各五錢黃芩斑蝥各三錢土蜂房蜜水洗飯上蒸晒乾白牽牛各二錢半川烏尖七箇為末每一錢濃煎木通湯調服毒從小便出如粉片血塊是也未効再服繼以宣毒丹解其風熱且瑛瑛性毒濟以馬尖或舊土麻悶者嚼葱白茶清下以解之如小便澀用燈心煎湯調五苓散連服用好膏藥貼若宜導瘰癧惡毒去

黃芩○瑛鷄丸瑛貓一兩薄荷四兩為末以鷄子清和丸
藁豆大空心及半空心臨卧茶清下丁九每日加一丸加
至五九每日減一丸減至一丸又每日加一丸加至五九
後每日仍服五九以臍下痛小便取不惡物為效如小便
秘要葱茶少許或用身鷄子一箇頂上開一竅攪勻以瑛
貓一箇入內以紙封之蒸熟去瑛貓吃彈一日一箇煎生
料五積散送下不過四五枚已破者
生肌未破者消散治瘰癧多年不瘥瘰癧已破蒜外治白

蛇白蠶宣熱補中而銀右蠶繭貓蝠可敷也

白蛇散白蛇
蛇二兩青皮

黑丑各五錢生犀角五分為末每一錢入膩粉五分研勻
五更糯米飲調下已時利下惡物十日後再進一服忌發
風壅熱物如瘡已成者一月可効治九漏瘰癧增寒發熱
或痛或不痛利後用海藻石決明羌活瞿麥各等分為末
米飲調下二錢日三服下盡清水後調補以除病根○白
蠶丸海藻姜蠶各等分為末取白梅肉湯泡搗丸梧子大
每六七十丸臨卧米飲下毒當從大便泄去忌豆心鷄羊
肝麪日五六服治癰生於頭項上交按名蛇盤瘰癧宜早治

之或單用海藻一片浸酒服亦好。○宜熱湯薄荷皂角連
翹何首烏蔓荊子三稜荊芥各一兩為末用熱醋浸淡豆
豉二兩半搗膏和丸梧子大每升丸熟水下日一服解癰
瘰癧風熱之毒自小便宣毒後及病雖愈宜常服之。○補中
益氣餅黃芪一錢人參三分甘草五分已上三味補氣調
為主當歸生地熟地白芍各三分已上四味和血生血
藥止惟芍藥兼能益氣之聖陳皮三分順氣升麻五分足
陽明引藥柴胡五分足少陽引藥連翹一錢散血結氣聚
瘰癧不可缺也防風五分散結去上部風邪已上共為末
湯浸蒸餅調劑捏作餅子晒乾搗如米粒大每三錢白湯
下治瘰癧馬刀核癰在手足少陽陽明部分受心脾之邪
而作如足陽明部瘰癧多倍升麻加漏蘆一錢乾葛五分手
足太陽項脊背腰強者加羌活一錢獨活五分腫甚加鼠
粘子三分堅硬加昆布硬甚加三稜莪朮各二分寒月身
涼或有腰痛加肉桂二分暑月身熱或有煩悶加酒黃連
黃柏各三分腸胃有痰血加牡丹皮三分少食加麥芽神
麴各二分便秘加酒大黃或蘇仁枳仁秦艽陰寒必結去
諸苦藥加附子一錢姜煎冷服如瘰癧陽明部分思柴胡

鼠乳子屬少陽部分為馬力拔癭忌獨活漏蘆升麻乾葛
加鹽麥三分○銀右散殊砂雄黃蛇含石礞石各一錢半
銀右石乳香沒藥各一錢七分明礬一錢信石白丁香各
六分麝香三分牛黃一分巴豆二錢半為末噀口涎調勻
用本身男左女右手塗瘡上外用新筆蘸藥四圍藥點
中間水粉膏貼之上藥一七二七其核自落後用生肌散
○蠶繭散蠶繭三箇白木信石各一錢俱火煨為末糝爛
肉上三三白其衣即下○貓頭散貓頭骨一箇蝙蝠一箇二
味俱微黑豆上同燒其骨化碎為通用貓頭要減加為貓
末乾糝治瘰癧多生不愈神效
頭骨一箇酥炙蝙蝠一箇以硃砂三錢填入腹內瓦上炙
焦南星白礬各一兩為末用黃蠟溶化和在菜豆大每
丸臨臥米飲下如風熱實者加防風黃芩山梔蟬退川
連翹桔梗各五錢虛者加夏枯草二兩虛癆骨蒸加玄
一兩胡黃連五錢汗多加牡蠣三錢有痰加麥門冬一兩
血虛加歸芍生地氣虛加參朮各一兩虛重加雄黃痛甚
加乳沒各二錢堅硬加海藻四錢成漏加穿山甲一兩便
瘰癧為丸空心及夜卧含化三九尤妙治瘰癧馬力下

開遠年近日已破未破
用此加裁得宜皆效
吞貼夏枯益虛者
夏枯草六兩水

二鍾煎至七分食遠服
虛甚者煎成膏多服
益善并塗患

處兼服十全大補湯
加香附貝母遠志
治瘰癧馬力已潰

未潰或日久成漏生血
散結退寒熱之聖藥也
惟實者宜

以行散之藥佐之
○治瘰癧潰爛久不愈者
用鼠骨亂髮

雞子大以三年臘月
猪脂煎令骨髮俱
出痰核潤便含化

消半匙酒調服
小兒鼠子從瘡口出
痰核潤便含化

丹或海帶丸以內消
融含化丹羣大黃青黛星各等
分爲末蜜丸含化治腦項耳後結

核○海帶丸海帶青皮貝母陳皮各等分
甚者加昆布爲末蜜丸大每一丸食後含化
治痰核瘰癧氣經久不消

嬰丹開結紙散或南星膏以外敷
瀉神効開結散香二錢木香三錢陳

皮四兩珍珠四十九粒砂鍋固濟火煨
猪酥肉子生拍取

下藥曬系一枚如棗大微扁色紅取
四十九箇瓦上焙乾

共爲末每二錢用時
冷酒調徐徐嚥下
輕者三五服見効

重者一料全愈
忌酸鹹油膩滯氣之物
治男婦下疳瘰疾

不問遠年近日皆効。○鮮掌散海藻一兩散一結黃柏二兩
隆火為末每用少許置掌中時時舐之津液送下太消三
分之二即止後服。○單方太蜈蚣搗酒頻服或海藻浸酒
久服癰氣瘰癧皆効。○南星膏鮮南星一箇細研調糊
好醋三五點和膏或醋調乾南星末亦好先將疔刺腫處
金氣透却以前膏攤紙上量形大小貼之覺痒則頻貼至
効治肌膚頭面頸項生瘰癧大如拳小如栗或軟或硬或
不疼不痛癰疽亦效熱者加黃柏虛者加川烏木少許

乳核一醉可消正貝中漏蘆可加

一醉膏瓜蒌一箇去皮
研爛甘草五錢沒藥二

錢半用紅酒三碗煎至一碗半分兩次溫服重者再進一
服以瘰癧為度或加當歸白芷乳香亦妙治癰疽發背乳癰
初起神効如要宣毒加皂刺一分。○古正貝散白芷貝母
各等分為末每一錢酒調頻服治有孕乳結按各內吹不
有兒外吹均宜此頻服不然膿出若無乳行者加漏蘆煎
酒調服外用此醇生變如蜂巢發上上有青色無妨焙乾
為末并水調敷如乾以水時潤之。○乳疔青頻服瓜蒌外
甚效加白芷貝母乳香沒藥少許

參芪難舍

單青皮湯青皮四錢水煎日二服治婦人久積憂鬱乳房內有核如鷄子一方用陳皮去白

炒為末入麝香少許每二錢酒調服初發赤腫痛不可忍

一服即散已潰及外艾炷亦如○瓜蔓散瓜蔓仁須毒青

皮陳肝各一錢石羔二錢清胃甘草節行痰沒藥止痛歸

尾破血皂刺金銀花各五分青橘葉取汁二已鮮毒水酒

各半煎空心服治乳癰未潰者即散如已潰者去石羔沒

藥皂刺金銀花用當歸身加入參黃芪川芎白芍煎服○

單方用蒲公英英金銀花等分水煎濃汁入酒少許服之即

散○治乳勞癰爛見心者用貓兒腹下毛服存性為末乾

糝或入輕粉少許消肺癰服以南星補肺脾真要訣消腫

許清油調搽

星一錢知母貝母生地阿膠川芎桑白皮白芨白芷甘草

各五分射干蘇梗天門冬薄荷杏仁半夏紫蘇防風各七

分半生薑七片烏梅一箇水煎服治肺癰有膿腥氣上衝

嘔吐破嗽○參芪補肺湯人參黃芪白朮茯苓陳皮當歸

山茱萸山藥五味子麥門冬甘草各五分熟地一錢半杜

丹皮一錢姜煎服治肺癰腎水不足虛火上炎咳吐膿血

發熱作渴小便不調○參朮補脾湯人參白朮各二錢黃
 芪二錢半茯苓陳皮當歸各一錢升麻三分麥門七分桔
 梗六分五味子四分甘草五分姜煎服治肺癰脾氣虛弱
 咳吐膿涎中痛不食凡肺癰見膿血久不愈必兼服此藥
 以補脾生肺
 止肺癰血用紫苑白蘇白芨非苟且
 此紫苑散
 此紫苑散

母貝母各一錢半人參桔梗茯苓各一錢阿膠甘草各五
 分五味子十粒姜煎服治虛勞咳嗽見膿血肺癰變癰○
 單白蘇散同檳榔皮煎湯飲之能收斂瘡口○單白芨散
 為末每二錢鹽煎糯米飯調服治久嗽成癰咯血紅痰

肉固清心散癰發背前
 肉固清心散辰砂茯苓人參白朮
 黃連黃芩豆朴硝甘草膠朮各角

各等分為末每二錢蜜湯調服治惡瘡熱甚癰痛作渴煩
 燥以此解毒神效○清心散遠志赤茯苓赤芍生地麥門
 冬知母甘草各等分姜煎服治癰有熱症如小便閉加
 燈心木通○清心丸黃連一兩茯苓神赤茯苓各五錢為末
 蜜丸梧子大每百丸米飲送下治
 諸痛痒瘡瘍皆屬心火此藥土宜神効瓜蒌湯癰生膿下

瓜蒌一箇當歸甘草各五錢沒藥乳香各一錢水酒各半煎服治乳癰腸癰一切癰疽初起者消已成者潰及潰後餘毒者勿皆宜
太射干能升胃三仁牡丹清芳
射干湯

赤茯苓升麻各一錢赤芍一錢半白朮五分水煎入地黃汁一合蜜少許調服治胃脘壅熱成癰腐爛成膿身皮甲錯咬嗽膿血如熱毒盛加磨犀角汁以助升麻咽痛使秘加馬牙硝馬勃○三仁湯薏苡仁二錢半冬瓜仁二錢桃仁牡丹皮各一錢半水煎溫服治腸癰腸中疔痛煩毒不安或腹滿不食溺澀婦人產後痺熱多有此病雖非是癰症藥以之間便可服之○牡丹散牡丹皮人參天麻白茯苓黃芪薏苡仁桃仁白芷當歸各一錢官桂甘草各五分木香三分水煎服治腸癰
本利敗醬梅豆
冷症腹瀉而痛時時下膿或

多寒
大黃湯大黃朴硝各一錢牡丹皮瓜蒌仁桃仁各二錢水煎服治腸癰小腹堅腫按之則痛肉色如故或微赤腫小便如淋汗出憎寒其脉遲緊膿未成者宜急服之○敗醬散薏苡仁二錢半敗醬一錢半附子五分水煎

空心溫服以小便利為度治腸癰腫數身無熱腹濡冷症

○舊臣湯烏梅一箇黑豆百粒煮以仁二合水煎入阿膠

生清黃各一錢再煎服治腸癰

必熱症及肺癰咳嗽膿血不止便毒兩解而敗瘰立消兩

湯辣桂大黃白芍澤瀉牽牛桃仁各一錢乾姜五分甘草

二分半水煎溫服治便毒內蘊熱氣外挾寒邪精血交錯

腫結瘰癧國老而元氣可掉國老膏粉甘草帶節一兩用山

火炙乾仍投前水浸透再炙至水乾為度用酒三盞煎至

八分空心服并查三日一服治懸癰不拘腫潰兩服即愈

痔初連魏連歸蘇葛秦老止痛神連魏散黃連阿魏山查

角各等分為末以少許置掌中時時舐之津液嚥下如三

分消二即止後服治食積痔○傳歸丸全當歸酒黃連各

四兩防風枳壳各二兩為末用前浸黃連酒打糊丸梧子

大每六七十九米飲下忌羊魚雞鰲煎炒熱物治痔漏及

脫肛便血○加味連壳丸黃連一兩枳壳厚朴各五錢

歸四錢木香黃柏各二錢荆芥二錢蟬皮一箇為末糊丸

梔子大每折九溫水下治濕熱內甚飽食腸癖發為諸痔
 久而成瘻○加味香蘇散陳皮枳殼川芎槐花各五分檀
 榔木香桃仁蘇莖香附甘草各二分半姜棗煎服治氣痔
 ○乾葛湯乾葛枳殼半夏茯苓生地杏仁各五分黃芩
 草各一分半里豆百粒姜三片白梅一箇水煎服治遇飲
 酒發動痔瘡腫痛流血○秦羌湯秦羌羌活各一錢二分
 黃芪一錢防風七分升麻麻黃柴胡桑寄生各五分藁本
 三分細辛紅花各少許水煎服忌風處大小便治痔漏成
 塊下垂不任○止痛丸羌活一兩郁李仁一兩半大黃八
 錢枳殼木香桂心川芎各五錢為末蜜丸梔子大每卅丸
 空心白湯下治痔瘡痛甚便燥者宜此微利之古云積氣
 生於脾臟傍大腸疼痛陣難言但食之即愈三焦火莫慢多
 方立建神○三神丸枳殼皂角五倍子炒各等分為末
 蜜丸梔子大每二十丸溫水下治痔酒色但飽食久坐
 成痔初起痔久槐角槐花地黃酒之金腸妙一兩地榆黃
 芩防風當歸枳殼各八兩為末酒糊丸梔子大每卅丸空
 心米飲下治痔漏脫肛五種腸風下血等症○槐角

九根角生地各二兩以生血以止山嵐黃芪各一兩阿膠
川芎各五錢以補虛黃連瀉心火條芩束木腸枳壳寬木
腸秦朮去太腸風所風為血症上使連翹為血症中使又
能散經絡中火邪地榆為血症下使又能來血升用各一
兩升散火邪又與白芷五錢引諸藥入大腸經絡蓋痔乃
經絡病也共為末蜜丸或酒糊丸梧子大每五十丸漸至
七八十丸溫酒下治痔漏通用及腸風下血○桃脂十
月上巳日揀肥實槐子用瓦盆盛法固密埋背陰墻下約
二三日深頭先取黑牛膽五六箇臘月八日取前槐子裝
在膽內高懸陰乾至次年清明日取出磁器收貯每空心
白湯下二日服二粒二日二粒漸加至十五粒止以後一
日減一粒週而復始不問遠年近日痔瘡服之如神久服
黑髮固齒○加味地黃丸熟地黃各一兩半槐花黃柏
杜仲白芷各一兩山茱萸獨活山藥各八錢牡丹皮茯苓
淨瀉各六錢白附子二錢蜜丸梧子大每五十丸空心米
飲下五痔瘡陰必用之○蠟皮丸槐花艾葉炒黃柏地
榆各五錢黃芪白芍杜膠貫衆各五錢絹皮二兩髮灰
三錢猪蹄甲十枚炙焦白芨一錢醋炙為末蜜丸梧子大

十石米飲下流諸痔出血裏急疼痛欲成漏者

五兩青礬煨白礬煨附子生各一兩白附子天南星枳壳

半夏訶子各二兩為末醋糊丸梧子大每廿九空心溫酒

下治諸痔久漏脫肛腫痛或生瘡時有膿血及腸風下血虛寒經久不愈

芎歸急補虛 牽牛酒黑牽牛末一分入猪腰子內以線扎

漏瘡中惡水自天腸出○豚胃丸蝟皮七錢并皮黃連

各一兩桃花二兩羌活六錢入猪肚內縫定煮爛去藥食

肚加飯再服以患處軟方止或同藥為丸服亦可痔漏皆

効○芎歸丸川芎當歸黃芪神曲各一兩桃花各五錢阿膠

荆芥木賊髮灰各一錢為末子大米飲下五十九治痔下血不止

黑玉自充竅

內生肌丸枯礬煨角芝麻各一兩為末蜜丸

梧子大溫酒下丸竅塞後去鹿角加象牙

一兩黃蠟為丸常服斷根○加味礬礬丸象牙五錢露蜂

黃蠟四兩爲丸，梧子大溫酒下。止丸治新久諸漏。○黑玉
丹，蜆皮、牛角、鹿角各八兩，猪脂甲一百枚，雷丸、芝麻各二兩，槐
角三兩，頭髮敗蒜各四兩，苦練根二兩半，俱入礮內燒存
性，取出入乳香一兩，麝香四錢爲末，酒糊丸，梧子大，先嚼
胡桃一枚，溫酒下十五丸，日二服，甚效。三服忌別藥，治男
婦痔漏、腸風、疼痛或數道，虫痒不可忍。○薰漏瘡方：艾葉
五倍子、白膠香、苦練根等分，布燒香法，置於漏內，坐薰，瘡
處○洗漏瘡方：露蜂房白，立或太腹皮，苦參煎湯薰洗，依
水出盡拭乾，取白東不榴根皮，爲末，以殺淫虫，少須
傳藥。○露葵散：人齒頭髮，雞冠花，各等分，俱燒存性，入麝
香、輕粉少許，以末乾，搽瘡者，麻油調搽，治漏瘡惡瘡，生肌
裏欲乾者用之。○蜂房散：露蜂房灸黃，二分，穿山甲、龍骨
各一分，麝香少許，爲末，臘月猪脂調傳，濕則乾，搽治久年
漏瘡，或膏差發，或終於別處。○取漏更法：用活黃鱈一
條，攤在地上，就其盤曲處，以竹釘五七枚釘穿，以香油塗
之，覆瘡上，痛布繫定，良久覺瘡痛不可忍，取鱈入水中，覺
蠕動，有血線之虫未盡，手覆如是者五六易，後用乾艾煎
湯入白礬三錢洗滌，以黃連、枳殼等分爲末，敷之，月餘方

取汗敷痔上痛止腫消○古熊水膏熊膽一分半冰片半

分爲未用白鷄膽三枚取汁或蝟牛田螺井水可調勻入罐內勿令泄氣照臥以手指搽痔上陰瘡栢蛤

銅綠石精蘆腦以津調栢蛤散黃栢以磁鋒割朱同蛤粉

粉燥濕故也治下痔濕瘡○銅綠散五倍子五錢白礬一錢乳香五分輕粉一字銅綠少許爲末洗淨糝之治男婦

陰部濕淹瘡○蘆腦散蘆茸石一兩半黃連八錢同入砂鍋煮一宿去黃連取茸石晒乾入片腦五分爲末乾糝治

下痔瘡或湯泡少許洗一切眼疾○津調散黃連款冬花等分爲末先以地骨皮蛇床子煎湯洗拭然後以津液調

敷治妬清瘡臭爛膿汁淋漓陰蝕鳳衣早螺截痔鴛管兼敷俵鳳衣散

煨黃連各等分輕粉片腦各少許爲末乾糝或鴨子清調治下痔瘡腫痛神效○早螺散白田螺壳煨過入腦膏輕

粉各少許爲末香油調搽下痔瘡上即愈○截痔散密陀

隋白礬白芨黃丹各一錢黃連五分輕粉一分腦時令半

分爲示乾糝或維入膏口以膏貼之治年深痔瘻膏太軟
○驚管散黃連太黃各一錢驚管石赤石脂各五分雄黃
一分片腦半分爲末津液調敷治病瘻後犯房玉莖皮破
腫痛○洗下痔瘡藥黃連黃柏當歸白芷獨活防風朴硝
荆芥各等分水煎入銅錢五十文烏梅五箇鹽一匙煎溫
湯日洗五七次洗後用木香檳榔黃連銅青輕粉枯礬螺
硝各等分麝香少許爲末至夜敷上

補心疏鯉膿滯陰丸如淋

補心湯人參
茯苓前胡半

夏川芎各三分陳皮枳殼紫蘇桔梗乾姜甘草各五錢當
歸白芍各一兩熟地一兩半每四錢姜末煎服治婦人陰
戶生瘡或痛或痒如虫行狀膿汁淋漓陰蝕已盡治之當
補心養胃如濕熱有虫者去姜蘇參梗加苦參北艾桃仁
吳萸水炒黃連○古硫鯉丸大鯉魚一箇去頭皮入硫黃
一兩黃泥固濟火煨烟盡爲末米糊丸梧子大每廿丸溫
酒下如直生虫所下如柿汁臭穢
及心中病瘰癧絕惡煩甚者不洽

藿香養胃瘡生子宮

可笑
藿香養胃湯藿香葦荻仁神麝烏藥砂仁半夏桑葉
白朮人參各五分萹澄茄甘草各三分半姜棗煎服

治陽明經，惡不裝肌，止囊痒。牡蠣、檳、硫、頻擦。牡蠣、丹、牡蠣、肉、陰、中、生、瘡、不、愈、一、

枯、礬、四、兩、為、末、遇、夜、睡、時、用、手、捏、藥、於、痒、處、擦、之、不、一、時、

又、搽、三、四、次、後、自、然、平、復、治、陰、囊、兩、傍、生、瘡、或、陰、濕、水、出、

其、痒、甚、苦、夜、則、搔、之、無、足、後、必、自、痛、又、兩、腋、及、脚、心、汗、濕、

無、可、奈、何、者、亦、宜、○、硫、檳、散、檳、榔、二、箇、破、開、以、黃、丹、三、錢、

合、在、內、濕、熱、包、煨、蛇、床、子、硫、黃、各、四、錢、全、蝎、六、箇、輕、粉、青、

黛、各、五、分、麝、香、少、許、各、為、末、和、勻、每、用、少、許、清、油、調、抹、兩、

掌、擦、熱、抱、囊、一、頃、次、擦、兩、腿、上、利、囊、濕、龍、膽、慢、炒、勿、燦、黑、

治、陰、囊、上、及、兩、腿、上、風、濕、癢、痒、利、囊、濕、龍、膽、慢、炒、勿、燦、黑、

湯、龍、膽、草、炒、黑、桑、木、通、耳、草、節、當、歸、金、銀、花、皂、刺、赤、芍、

防、風、黃、連、其、更、水、炒、各、等、分、水、煎、服、一、服、腫、痛、止、後、加、川、

芎、伏、苓、治、陰、囊、濕、附、骨、寒、濕、漏、蘆、敢、以、汗、下、蘆、白、欬、黃、岑、

痛、溺、瀝、寒、熱、作、渴、附、骨、寒、濕、漏、蘆、敢、以、汗、下、蘆、白、欬、黃、岑、

服、治、一、切、惡、瘡、毒、腫、丹、癰、瘰、癧、疔、腫、魚、眼、五、疔、發、癰、疽、目、翳、

吹、妳、初、起、如、傷、寒、表、裏、症、具、者、宜、服、附、疽、濕、熱、蒼、柏、加、以、青、甘、蒼、木、黃、柏、各、

服、治、一、切、惡、瘡、毒、腫、丹、癰、瘰、癧、疔、腫、魚、眼、五、疔、發、癰、疽、目、翳、

吹、妳、初、起、如、傷、寒、表、裏、症、具、者、宜、服、附、疽、濕、熱、蒼、柏、加、以、青、甘、蒼、木、黃、柏、各、

三錢青皮一錢半甘草五分原者加半膝一錢夏加黃芩
 八分冬加桂枝五分痛甚無汗加麻黃二分水煎入姜汁
 少許調服治環跳穴痛不日

大苦參 **人面於膝蓋**

太苦參九苦參四兩防風荆芥白芷

川烏赤芍何首烏獨活山柁川芎牙皂蔓荊子茯苓山藥
 茯苓黃芪羌活白附子各一兩草烏三錢為末麴糊丸梧
 子大每三五十丸空心溫酒
 茶清下治人面瘡及腫瘡

白膠香敷傷手於脛尖

白膠香

白膠香赤石脂枯礬各五錢黃丹各五錢文藥輕粉各二錢
 為末乾糝濕則油調敷諸疥侵蝕日久不愈下注腫瘡
 疼痛內外踝生瘡謝傳傷手瘡方瘡疥火瘡癩瘡各五
 錢片腦五分花椒龍骨各一分有膿水加輕粉一錢為末
 乾糝濕者麻油調搽治脚上生瘡腫痛
 外腫龍骨馬齒而

土兼除濕熱

龍骨黃芩龍骨各一錢半肥皂子燒存性五箇為末用綿

紙雙重以針掛亂孔清油調藥夾內縛貼瘡上隔日一番
 內面貼之馬齒膏馬齒莧煎汁一盞渣去查入黃蠟五

皮肉久然成瘡，塗之治卅六種風瘡，多年惡瘡及膿瘡濕癰，白朮杖瘡，旋加梳垢，可封疔腫。○蜜土膏：經年蜜電土燥烈，或只用蜜心土黃丹，輕粉黃柏散熱乳香，沒藥散，瘡赤石脂生肌，各等分，爲末，清油調成膏，用傘紙夾住貼之，以綃縛定，縱痒不可動，直待膿蒼結痂，去之未愈，再貼，先以茶清洗過方貼。

黃蠟能補潰瘡：桐油膏、桐油二兩，宜水毒百草霜生肌，止

灰乳香各三錢，同熬成膏，搗油紙上貼之，血虛痛甚，散尤宜。如經年紫黑者，先用蠟灰膏去瘀，○斬艾膏：斬艾、川椒

各五錢，水粉一兩，草丹三錢，輕粉一錢，爲末，熟麻油調膏，隔紙貼之，効。○瘰癧若紙綿紙，疊十一重，看瘡大小，剪成方

塊，以紙擦瘡，住却用麻油二兩，入川椒四十九粒，慢火煎枯，黑去查，入槐枝四十九寸，煎枯，黑去查，入黃蠟一兩，枯

礬一錢，輕粉二分，俟溶化，卽入前紙，炙油，塗透，勿使焦黃，取起，卽時用槐枝葱椒煎湯洗拭，取前紙，齊水，是上外另

用油紙緋綃緊縛，過時取下，近瘡紙一重，候紙取盡，則瘡全愈。其効如神。氣虛膿多者尤宜。○黃蠟膏香油一兩，入

胎髮如梅大熬消化入白膠香黃蠟各一兩溶化入生龍
骨赤石脂血竭末各一兩攪勻候冷磁器收貯每用捏作
薄片貼瘡上外以藥末鋪帛車之三日後
番過藥貼以活血藥煎湯洗之外瘰亦效

瘡疥活血四物

擇皮首烏當歸連歸可

地各一錢半桃仁九箇紅花一

錢蘇木八分連翹黃連防風甘草各六分水煎服治諸疥
瘡經久不愈○擇皮散擇皮枳壳各燒存性四兩杏仁水

煮熟荆芥穗各二兩炙甘草五錢為末每服二錢溫好酒
調下治肺臟風毒遍身瘡疥及癰疹瘡疥兼治面上粉刺

風刺○何首烏散何首烏荆芥防風蔓荊子藏藥仙蚬蚊
草甘草各一兩為末白湯調服二錢治脾肺風毒頭面遍

身癰疥瘡痒及紫白癰風肌肉頑麻等症○當歸飲當歸
白芍川芎生地防風荆芥炭藥各一錢何首烏黃芪甘草

各五分姜煎服治遍身疥癰或腫或痒或膿水浸淫或發
赤疹癰瘡皆心血凝滯內蘊風熱所發○當歸丹當歸五

錢黃連一錢半太黃二錢半甘草一兩為末先以當歸煎
成膏和胡椒大每一二十九食前米飲下漸加至利為

度治疥瘡血熱便秘及疹痘已出聲啞喘急便秘等症

連歸湯黃連當歸各一錢連翹黃芩各七分升草三分黑

瘦人合四物湯加大楓子黃柏肥白人加荆防羌活白芷

蒼朮取其能勝濕也稟受實者合四物湯加大黃芒硝水

煎服治疥瘡摩風一上吳茱萸草三黃硫黃任氏

謂瘡痛瘡疥摩風一上吳茱萸草三黃硫黃任氏

五錢大楓子十四箇杏仁廿箇枯礬黃柏各二錢川椒輕

粉水銀各三錢雄黃一錢半銀珠一錢為末用烏柏油三

兩研勻為丸彈子大磁器收貯每用少許呵洋通擦之治

疥癬風癩諸熱痒瘡及婦人陰蝕瘡漆瘡火丹諸般惡瘡

一上散雄黃三錢半寒水石白膠香黑狗脊蛇床子各

一兩枯礬黃連各五錢吳茱萸硫黃各三錢琥珀十四箇為

末先以湯洗去瘡痂後用臘月猪油調手掌心擦熱

中嗅二三次却擦上一擦即愈治濕疥腫痛作痒臭爛

吳茱萸散吳茱萸白礬各一錢寒水石二錢半蛇床子三錢

黃柏大黃硫黃輕粉各一錢攪攪一箇樟腦五分為末香

油調敷治乾疥及春月發者宜此開鬱為主

水石燕美各二錢剪草枯礬吳茱萸各一錢蒼朮厚朴

雄黃各五分蛇床三錢輕粉一錢為末香油調敷治沙疥
○三黃散黃芩黃連大黃各三錢蛇床子寒水石各三兩
黃丹五分白礬一錢輕粉白芷無名異木香各少許為末
須先洗刺破油調敷之治膿窠瘡退熱消腫止痛乾膿然
痂一硫黃餅礬製硫黃一兩為末用水調成餅貼患處
底覆轉用蘄艾一兩川椒三錢為末火燃薰乾硫黃臨用
先以柳桃桑槐楮五枝煎湯洗拭然後用麻油調硫黃末
搽之治疔瘡及冷瘡毒就火灸湯泡者抑考退熱治乾
痒出血須用芩連大黃或松香樟腦退腫止痛須用寒水
石白芷止痒殺虫用狗脊或蛇床子枯礬殺虫用蕪荑水
銀硫黃甚苦者加礬蘆瑛狗乾膿用無名異松皮炭頭瘡加
黃連方解石脚上用黃柏陰囊用吳萸紅色用黃丹青色
用青黛甚苦就火與熱湯用硫黃
濕瘡用香油調乾瘡用猪油調頑癬浮萍為君頑癬九浮
耳各一兩苦參一兩半黃芩五錢香附二錢半為末酒糊
為丸白湯下○古游蛇九浮萍半片烏梢蛇三錢為末酒
九重六錢三日服一丸用風藥洗身上隨量將
酒嚼下取汗九內服三九大麻風癰亦効忌菴
血風馬莧

可覓

大馬齒莖馬齒莖乾五錢黃丹黃柏枯礬兒茶各三錢輕粉一錢為末生桐油調攤油紙上用葱椒煎

湯洗淨患處貼之治兩足血風癢并兩足背風濕癢痛痒至骨者效

造莫遲疑

醉仙散胡麻子牛蒡子蔓荊子拘杞子各一兩俱炒紫色白蒺藜苦參瓜蒌根防風各五錢輕

粉四錢為末每一錢早午晚各茶清調服服後五七日間

先於牙縫內流涎臭涎渾身覺癢如醉後利下臭屎

膿血為効量大小虛實服之治大風病遍身癢疹癢痒麻

木或去輕粉量體加參連可調理餘毒再造散大黃皂

刺各一兩白牽牛六錢當金五錢一方無此二味為末每

五錢或二錢五更酒調而東服之當日利下惡物或膿或

虫如虫皆黑色是多年赤色是近日數日後

又進一服去虫積盡乃止大治癩風惡疾

瀉參蛇蠍痺換肌骨

大蘇風丸苦參三斤羌活獨活白芷白藜白蒺藜天花粉何首烏各四兩

皂刺煨當歸各半斤為末用皂角五斤切細溫水浸五日

去查慢火熬成膏和九梧子大每百斤空心酒下治大瘰

大蘇風丸補

風初起遍身瘡點五色不知痛痒手足麻木等症紫雲
風丸何首烏四兩五加皮羌活獨活白芷細辛生地黃防己黃連芍藥
兩半牛蒡子羌活獨活白芷細辛生地黃防己黃連芍藥
蟬退防風荆芥蒼朮各一兩思未煉蜜或酒糊丸梧子大
每七十丸溫酒米飲任下治血分受濕遍身發紫血疱痛
痒有虫若白水疱則為天疱瘡乃此類之輕者○補氣瀉
營湯升麻連翹各六錢蘇木當歸黃連黃芪全蝎地龍各
三分黃芩生地各四分人參二分甘草一分半桔梗五分
桃仁三枚水酒各半煎減半入麝香少許胡桐淚一分蜜
虫水蛭各三枚白豆蔻二分丹煎熱服或為丸亦好治大
風滿面連頸極痒眉脫鼻崩膚敗宜辛溫散血并溫補氣
兼瀉胃熱心火以止痒補肺以升陽外用針砭去惡血忌
酒麪生冷物○活神丹羌活玄參當歸熟地各等分為末
蜜丸梧子大每五十丸空心白湯下大風病血虛者可常
服之○加味苦參丸苦參一斤防風荆芥蒼耳子胡麻子
皂刺各十兩蔓荊子牛蒡子黃荊子枸杞子何首烏禹餘
糧蛇床子各二兩白芷一兩半為末用皂角煎膏和丸梧
子大每五十丸茶酒任下治大風瘡及諸風赤白癩風○

車苦參酒苦參半斤洗淨剉碎將絹袋繫濕酒二壆春冬
浸一月秋夏浸十日每飲一小鍾日三次大能消一切風
熱瘡毒理脾補心養氣瘡科聖藥如酒盡以苦參晒乾爲
末酒糊丸服尤效○三蛇肝土蛇蛇烏梢蛇白蛇各一
條苦參四兩爲末用皂角煎膏爲丸梧子大每六七十丸
煎防風通聖散下粥飯壓之日三服三月一洗乃安治大
風手足麻木髮脫眉落遍身瘡疥癰痒一切疥癬風痰皆
效○白蛇蛇丸白蛇蛇一條當歸二兩川芎白芍生地防
風荆芥酒芥連翹胡麻子何首烏升麻羌活桂枝各一兩
爲末煎浸蛇酒和水打糊丸梧子大每七十丸茶清下治
頭面手足白屑瘡痒皮膚皴燥○蠲痺散羌活獨活皂刺
白芷各五分當歸白木各一錢半赤芍一錢土茯苓五錢
水煎服治癩風肢節疼痛此寒血祛風○換肌散烏梢
蛇白蛇蛇地龍各二兩細辛一錢天麻蔓荊子當歸苦參
威靈仙酒芥穗并菊花紫參沙參木賊不灰木炙甘草沙
苑疾藜天門冬赤芍定風草何首烏石菖蒲胡麻子草烏
蒼朮川芎木鱉子各一兩爲末每五錢湯酒調服治癩風
年深不愈以致骨變脫落鼻衄崩損重者方可服之○換

骨丸 苦參 浮萍 各一兩半 大黃 槐花 白芷 川芎 各一兩 二錢 蒼朮 一兩 乳香 沒藥 沉香 木香 各三錢 麝香 五分 爲末 用麻黃五斤 煎膏 和左 脾子 大每一丸 脾卧 溫酒 化下 忌風 二三日 兼治 二三日 亦療 風疾 一方 去蒼朮 加當歸 防風 甘草 白朮 花蛇 虎骨 〇 寒 膏花 散 凌 膏花 五錢 蟬退 地龍 桑 蠶 全蝎 各七枚 爲末 每二錢 酒 調服 服後 於浴室 中住 在湯內 一時許 服藥 則効 治 諸癰 疽 疔 〇 浴 癰 方 用 桃 柳 桑 枝 梧 五枝 各一片 煎濃 湯 一桶 先 煮 候半 盞 坐 桶內 平 頸 重 浸 洗 一白 一白 洗 兩 次 極妙 一也 瘡 疽 亦効 〇 楊 梅 輕 減 通 聖 丸 搽 洗 何 須 幾 遭 〇 加 減 通 聖 散 防 風 白 鮮 皮 赤 芍 連 翹 黃 芩 各八分 牛 蒡 子 一錢 金 銀 花 三 分 山 慈 歸 尾 各五 分 荆 芥 槐 花 各四 分 羌 活 草 各二 分 水 煎 服 如 初 起 便 秘 加 酒 大 黃 一錢 半 便 難 加 皂 子 三 分 胃 弱 皮 少 加 白 朮 一錢 陳 皮 半 夏 各 五 分 頭 上 多 加 川 芎 八 分 薄 荷 一 分 下 部 多 加 牛 膝 黃 柏 各 四 分 遍 身 多 加 木 通 桔 梗 地 骨 皮 各六 分 心 火 加 黃 連 腎 火 加 玄 參 各四 分 氣 虛 加 參 芪 血 虛 加 熟 地 各六 分 久 虛 便 利 加 硬 後 五 錢 〇 加 減 通 聖 丸 卽 前 方 共 半 斤 再 加

苦參半斤為末酒糊或蜜丸梧子大每七十丸空心米飲
溫酒任下○搽藥杏仁十四枚針桃火上燒半生半熟輕
粉一錢片腦二錢為末猪膽汁或香油調搽不痛者加
膽粉三分磨風膏亦好○洗藥土也骨皮荆芥苦參細辛
各五錢煎湯先蒸後洗遍身出汗為
効如洗務要湯寬浸洗良久方佳
楊梅重多化毒散吹

藥限定三日

化毒散生火黃一兩鮮熟毒桑山甲五錢
者三錢解毒姜蜜二錢去風蜈蚣一條去虫

歸尾五錢破血為末每二錢酒調日二服○吹藥黑鉛八
分溶化入水銀一錢同結成餅銀珠一錢半炒明礬雄黃
各一錢為末藥肉搗勻分作六丸每用一丸放火籠內
病人以巾包頭口吹服看其藥丸符烟盡則止當日早午
晚各吹一九次日早午吹二九第三日只早吹一九吹後
三五日或口流涎以黃連葉煎湯解之又服化毒散三
日後以加戒通聖
散丸調理漸根
皂刺皂根頑癬筋疼可祛
皂刺皂根

何首烏石南藤白蒺藜五加皮地骨皮白鮮皮各七錢草
烏枸杞牛蒡子歸尾五靈脂蔓荊子胡麻子防風苦參虎

肥膏地龍京墨木鱉天花粉各五錢白膠香乳香沒藥各
 三錢痛甚加麝一字為末麝粉為丸梧子大每五十九硬
 飯湯下日二次服兩月斷根忌狗肉魚腥房事治遠年楊
 梅瘡癰頑瘡筋骨疼痛○皂根丸當歸二兩黃芪一兩半
 人參勸艾各一兩麻黃五錢皂角樹根皮四兩為末蜜
 丸梧子大每五十九丸土茯苓煎濃湯下治楊梅風毒○仙

狼象牙大楓癰漏如失
 防風木瓜木通薏苡仁白蘚皮金

銀花各五分皂子四分水煎空心日三服治楊梅風毒及
 誤服輕粉以致癰瘰筋骨疼痛不能動履或壞肌傷骨者
 服此除根永無後患凡患下疳瘡者宜此預防之如氣血
 加參黃血虛加芎歸熟地牛膝膝熱去土茯苓苡意苡仁
 金銀花○仙遺糧丸土茯苓一片防風木通薏苡仁防七
 白茯苓金銀花木瓜白蘚皮皂刺各五錢白芥子四錢當
 歸身七錢為末蜜丸或浸酒服忌生冷煎雞煎炒茶酒房
 室十餘日治楊梅瘡後腫塊或癰如惡弱者加人參五錢
 甚妙○單仙遺糧丸一味為末蜜丸梧子大每五十九丸
 煎前湯下治楊梅瘡或鼻崩眉落筋緩骨痛者皆效○象

牙丸象牙三錢驚甲蠟皮各一箇為末，棗肉九櫻桃大每
一丸空心小便化下服，七日後仍用三味為末，猪膽汁調
敷，浴楊梅瘡成漏。○大楓子肉半斤，荆芥當歸苦
參各一兩半，羌活獨活防風，蟬退全蝎各一兩，為末，用大
楓子壳煮汁和晚米糊丸，梧子大，每百丸，日三次溫酒下，
但大楓子性熱燥，痰傷血服多病，愈失明用者慎之。○取
輕粉法用開口川椒每空心以土茯苓煎湯吞下，廿粒即
利，輕粉於椒內從大便出，洗却川椒服至椒內無輕粉乃
止。○治天庖瘡，乃用野菊花、葦木根煎湯洗，洗後用防風
通聖散同新調泥為末，罌口蜜調敷之，或只用黃柏
滑石為末油調敷之，亦從壯皮上起者。
裏熱發外宜內服防風通聖散加。

提行寶金外治十

種有三

提行寶金雄黃硫砂各三錢青鹽砒霜白丁香輕

為末用黃蠟溶化，和九梧子大，捻作錠子，用針刺破，打頭
放一錢於上，又刺四五七下，令惡血出為妙，却用水
粉膏貼之內服，賽命丹治疔瘡危篤，兼治瘰癧。○賽
金丹用明礬四兩溶化入黃丹二兩，銀釵攪之，慢火熬令

紫色色先以針周迴挑破用津液調敷數度無令瘡乾其疔
即潰如不潰入信石一錢雄黃細砂各五分貼之即潰治

一十三種疔瘡追疔保生接命奇功第一
追疔湯羌活獨活青皮
防風黃連赤芍細辛甘

草節蟬退姜蠶獨腳連合五小先將澤蘭葉金銀花金線
重樓各一錢生薑搗酒或搗水入酒熱服然後用生薑十

片水酒各半煎前藥熱服衣覆取汗如有膿加首烏白芷
要利加青木香大黃在肘加木瓜病減後前藥加大黃二

錢以去餘毒○保生錠子蟾酥三錢雄黃二錢為末用青
桑皮一兩同搗如泥為丸六分重捻作錠子硃砂為衣陰

乾如疔瘡用冷葱湯磨服八分仍用冷葱湯漱口熱下外
用針刺開疔與將錠子一分填入疔內被蓋出汗二日爛

出即愈如背發亦用冷葱湯磨服再磨一分敷患處被蓋
出汗其患即愈體虛清貴及婦人胎前產後毒瘡者最宜

○蟾肝丸端午日取蟾肝一具入雄黃五錢搗丸黍豆大
硃砂為衣每二十九粒酒下善能發汗解毒如痘疹不出用

胡荽酒下最妙○賽命丹蟾酥硃砂雄黃膽礬血竭乳香
次藥各三錢蜈蚣麝香各五分細辛全蝎蟬退桑中甲姜

鐵牙各六錢白礬用信少許同枯去信不用片臘各五
分爲末端午日用酒糊丸菡豆大每三九用葱酒一小鍾
吞下後蓋出汗或吐或不汗再進一丸服後喫白粥調理
忌食鹹水一切動風之物治癰疽發背疔瘡乳癰魚口
便毒一切無名腫毒及小兒臍風亦効賽飛龍奪命丹
一檢金卽前賽命丹爲末每服二三分溫酒調下如服賽
命丹後毒未盡定再用此未催之惟疔瘡服此藥後身寒
者卽見效治疔單方蒼耳草一握生薑四兩同搗爛入生
頭酒一斗去查熱服大汗卽愈或以菡豆野菊花爲末酒
調飲時臨飲痛定熱除外用蒼耳根莖苗子燒灰爲末醋
泔或醃調塗疔上毒根卽出山鄉疔腫初起緊急無賽命
丹者用此更快又或無蒼耳處用烏柏葉搗汁一二碗頓
服得大便利爲妙冬月用根研水服之以利爲度食災牛
馬患者尤効五聖湯大黃金銀花甘草各一兩小黃連一
兩皂刺二兩每用生薑一兩酒煎服一方去皂刺加當歸
赤芍枳殼治一切疔腫癰疽初覺憎寒頭痛○蜂蟻散土
蜂房一窠蜂退一條共入罐中鹽泥固濟火煨存性爲末
每下錢空心酒調服少頃腹中大痛痛止疔瘡化爲黃水

體實者後
服五聖湯
折傷損內 鷄鳴花藥石 堪消 鷄鳴散 大黃一兩
桃仁七粒 梔子五

錢酒煎五更鷄鳴時服取下惡血即愈治墜壓傷損瘀血
凝積痛不可忍若氣絕不能言者急以小便灌之即醒

花藥石散硫黃四兩花藥石一兩為末入瓦罐內蓋泥固
煎藥石安四方磚上以炭火自巳午時煨至五更宿候冷取

出研細磁罐盛之如一切金刃及打撲身體出血者急於
傷處粉藥其血化為黃水如內傷血入臟腑熱煎童便入

酒少許調服一錢立効如牛觸腸出不損者急送入用
白皮或生白麻為線縫合肚皮縫上糝藥血止立効並不

得封裹瘡口恐作膿血如瘡乾以津液潤之然後糝藥如
婦人產後敗血不盡惡露奔心胎死腹中胞衣不下並用

童便調服○單人中白散火煨醋淬為末
每五分酒調服治閃挫跌撲傷骨極重者折傷見紅歸鬚

時霜可室 常歸鬚散歸鬚一錢半紅花八分桃仁七分其
草五分赤芍烏藥香附蘇木各一錢官桂六分

水酒各半煎空心服治打撲以致氣凝血結胃腹脇痛或
寒熱如拌閃氣血不順腰脇痛者加青皮木香脇痛加柴

胡川芎○古蚌霜散蚌粉百草霜各等分爲末每一二
糯米飲調服側柏枝研汁尤効治傷損大吐血或因酒食
飽低頭擗損吐血過多并血妄行口鼻俱出但聲未失者
皆効如鼻衄舌衄及灸瘡出血並用乾糝立止○古烏附
湯烏藥一錢香附二錢甘草三分爲末淡鹽湯調服治跌撲吐衄不止又能調中快氣治心腹刺痛定痛應

補陣王

乳香定痛散乳香當歸白朮各二錢白芷沒藥
甘草羌活各一錢爲末每二錢溫酒并童

便調服治打撲墮傷損一切疼痛如血虛者去羌參加
川芎芍藥生地牡丹皮○應痛丸草烏八兩生薑生葱各
一斤同搗淹兩宿焙乾木破故紙骨碎補各八兩穿山甲
小茴各六兩爲末酒糊丸梧子大每五十九粒溫酒米飲任
下忌熱物治折後爲四氣所侵手足疼痛○陣王丹太黃
一兩石灰六兩同炒灰紫色爲度去火毒篩過敷傷處立
効一方加小兒髮灰乳香沒藥蒲黃各少許爲末用未開
煎老鼠屎和藥搗爛陰乾爲末不問刀箭出血木石損傷
敷之如神且來骨接骨見醫術
確三分生薑一兩酒糟一

碗腫者加紅肉滑同搗爛敷手足折傷之處一方用菜豆粉一味炒令紫色以熱酒同熱醋調敷損處用竹紙蓋地將杉木皮或桑皮二片夾定其効如神○小兒驚風小麥麴餅煤各五分狗頭骨乳香五倍子各一分為末用熱酒調敷痛處不可敷破處重者加天靈蓋少許尤効爛者只用厚毛草一味搗爛敷之或以此草煎湯洗亦好○接骨紫金丹土鱉自然銅骨碎補大黃血竭歸尾乳香沒藥硃砂各等分為末每八釐熱酒調服其骨自接治跌打骨折瘀血攻心發熱昏暈及瘀血自下吐血等症如遇經事不調每服加麝七釐即通○接骨丹乳香沒藥各五錢自然銅一兩滑石二兩龍骨赤石脂各三錢麝香一字為末用好酒二碗煮乾就炒燥為末化黃蠟五錢為丸彈子大每下九酒煎用東南柳枝攪散熱服若骨已接去石脂龍骨臨卧含化下丸亦妙○麻藥方牙皂木鱉紫金皮白芷半夏烏藥土當歸川芎川烏各五兩草烏小茴坐拏草酒煮熟各下兩木香三錢傷重手道不得者更加坐拏草草烏及蔓陀蘿花各五錢並無製煨為末諸樣骨碎骨折出血者每服二錢好紅酒調下麻劑不識痛處或用刀割開或

剪去骨鋒以手整頓骨節歸原用夾夾定然後醫治如筋
鐵入骨不出亦可用此麻藥或鉗出或鑿開取出後用鹽
湯或鹽水煎服立醒○闕齒方點椒五錢天靈蓋紅肉消
白並各二錢為末齒動移上即安或已落有血絲未斷者
亦可移藥齒間闔之○接指方真蘇木為末敷斷指間
接定外用蠶繭包縛完固數日如故亦治刀矢所傷者

破傷

開關定搐蜈蚣星風及二烏

蜈蚣散蜈蚣二條江鰮
三錢無江鰮以全鰮代

之為末每一錢防風羌活煎湯調服治破傷風搐搦角弓
反張外用擦牙或吹鼻亦好如表解不已傳入裏者當服
江鰮丸○單全蝎散蝎霜七箇為末熱酒調服凡患破傷
風症非此不除○古星風散南星防風各等分為末如破
傷及金刃傷或打撲內有損傷以藥末敷傷處然後以溫
酒調下一錢如牙關緊急角弓反張及打傷欲死但心頭
微溫者以童便調灌二錢并進二服如顛犬咬先以口含
漿水洗拭移之更不作膿大效蓋南星為防風所製服之
不麻○二烏丸生川烏白芷天麻各二錢生草烏雄黃各
一錢為末酒糊丸梧子大每十九丸溫酒下治破傷風角弓

反張牙關緊急○烏蛇散烏梢蛇六錢麻黃一兩甘草烏乾
姜附子川芎白附子天麻各五錢蝎梢二錢半為末每
錢熱酒調日三服治
破傷風及洗頭風
破傷止血定疼
蟾蜍魚膠與甲質
酒破傷初覺有風時急取熱糞堆內蟾蜍一箇用手
捏住待口吐些小水如緊急只剪去尾肚內黃水
抹瘡口再滴些小入熱酒內飲之身穿厚衣片時瘡口覺
麻兩脇微汗風出立効虎咬亦宜○魚膠散魚膠燒存性
為末入麝香少許每二錢熱酒米飲下亦可溶化外敷
治破傷風口緊強直○硃砂指甲散人手足指甲燒存性
六錢硃砂南星獨活各二錢為末分作三
服熱酒調下治破傷風手足顫掉不已
表熱瓜石小芎

而半表無汗審羌榆

瓜石湯瓜薑仁九錢滑石一錢半南
星蒼朮赤芍陳皮各一錢黃連黃柏

黃芩白芷各五分甘草二分姜煎服治破傷風發熱○小
芎黃湯川芎五錢黃芩三錢甘草一錢水煎服治破傷風
表熱○羌麻湯羌活麻黃菊花川芎石羔防風前胡黃芩
細辛枳殼茯苓蔓荊子甘草各五分白芷薄荷各二分半

姜煎服治破傷風半表半裏無汗○掄了散地榆紫花
地丁草防風馬齒莧各等分爲末每三錢溫米飲下治破
傷風半表裏頭微汗身
無汗不可發汗者宜此裏實江鯁大芎而臍和養血兼防

水

江鯁丸寄鵲糞炒江鯁燒姜蠶各五分雄黃一錢蜈蚣
二條天麻一錢爲末分作二分將一分燒飯爲丸梧子

大

砂爲衣將二分加巴霜二分半飯爲丸每用硃砂藥

廿九

加巴霜藥一丸二服加二丸至便利爲度再服硃砂

藥

卽止治破傷風發而發搐臍滿秘澀邪在裏者宜

此下之

大芎黃湯用芎一錢大黃羌活黃芩各二錢水

煎服治破傷風

二便秘赤白汗不止○養血當歸地黃湯

當歸川芎生地芍藥

本防風白芷各一錢細辛少許水

煎服治病久氣血

漸虛邪氣入胃宜此養血榮筋○白朮

防風湯白朮黃芪各

二錢防風四錢水煎溫服治破傷風

發表過多臍臍和

而自汗不止者宜

通用

忍冬或九或散忍冬膠五兩甘草節一

兩或加黃芪當歸各

五兩尤妙入砂鍋內水二碗慢火煎

至一碗入酒一大碗

煎數沸作三次溫服一日夜喫盡如

病重一日夜服兩劑俟大小腸通利為藥力到外用忍冬
藤連花葉木梓搗爛入酒少許敷瘡四圍留中以泄毒氣
治一切癰毒外發內疽及婦人乳癰常服托裏消毒一方
用忍冬根藤花葉置罐內以酒浸之煉火煨一宿取出晒
乾入甘草少許為末酒糊丸梧子大每百丸溫酒
米飲任下消渴後宜服此藥預防發癰亦主痔漏
蠟加禁加葱 蠟藥丸黃蠟二兩溶化待溫入明礬末四兩
和勻衆手急丸梧子大每廿丸食前酒下日
二服定痛生肌護膜止瀉消毒化膿及諸內癰排膿托裏
之功甚大或金右補藥發疽非此莫治若遍身生瘡狀如
蛇頭者每服百丸大有神效若蛇蝎及一切毒虫所傷溶
化熱塗患處內更服之其毒即解為外科癰疽之要藥也
服至三兩兩後愈見其功癰毒潰後服之甚捷腸癰瘰癧
及內科心痛尤効如漏瘡用丸溶化加鷄膽一匙髮灰末和
勻成條塞入漏孔○葱藥丸端午午時取明礬為末酒
礬盛之遇腫毒初起用末三錢和葱白搗勻酒調服盡
量一醉或吐以茶壓之或飯與葱搗丸服亦可外用礬末
五錢麝香一分取蝦蟆腸肚和藥搗膏敷瘡四圍一日夜

即愈治諸腫發返魂湯既可加減赤芍木通白芷何首烏
背一切惡瘡

草各五分水酒各半煎湯使隨症用之治血氣逆於肉理

故令壅結癰疽最宜調和榮衛但此方宜與內托十宣散

相間用之並加忍冬藤最治內癰但當審其虛實或通或

補之則用附子通則用大黃如不明虛實則此方亦能通

順可無他變准流注加獨活海狗加化毒丸仍要折衷黃

穿山甲全蝎蟬退連翹隨症加減

牽牛槿花白芷穿山甲蜈蚣蕪全蝎雄黃硃砂礞石酥明

礬鉗丹各等分爲末米糊丸梧子大每八九粒酒下癰疽

初起用之發汗如神痛極乳香內服口渴竹葉見効乳香止痛散粟

兩灸甘草陳皮各二兩沒藥乳香各一兩丁香五錢每五

錢水煎服治驚腫疼痛不止竹葉黃芪湯淡竹葉生地

各一錢黃芪麥門冬當歸川芎甘草黃芪芍藥人參半夏

石羔各五錢水煎服治癰疽氣血虛胃火盛而作渴等症

潰甚聖愈作主食少參芪收功聖愈湯生地熟地川芎人

錢水煎服治癰疽膿水出多心煩睡卧不安五心煩熱等症○人參黃芪湯人參白朮陳皮蒼朮麥門冬當歸各五

分黃芪一錢升麻六分黃柏四分神麩三二分水煎服治潰後少食不眠發熱等症○蒜灸以拔毒

隔蒜灸法先以濕紙覆上立候紙先乾處為蒜頭記定然後用獨蒜去兩頭切中間三分厚安蒜頭上用艾炷於蒜

上灸之每五炷換蒜再灸如瘡大有十數頭依一處生者以蒜搗爛攤患處鋪艾炷蒜敗再換治一癰疽腫毒大

痛或不痛或麻木若痛灸至不痛不痛灸至痛其痛乃隨火而散此拔引營毒從治之法有回生之功若瘡色或白

或紫不起發不大痛不作膿不問日期最宜多灸未成者消已成者殺其太勢○豆豉餅淡豆豉為末用唾津或飲

口水和作餅如錢大半分厚置患處以艾炷餅上灸之餅乾又易治癰疽腫硬不潰上而不斂并一切頑瘡惡瘡未

成即消已成即潰不發者氣血虛敗也○桑葉熨以祛風桑葉炙法治發背不

效者氣血虛敗也○桑葉熨以祛風桑葉炙法治發背不

背吹息火焰以火頭灸患處日三五次每次片時取瘡肉腐動為度若腐肉已去新肉生遲宜灸四圍陰瘡瘰癧流

注腫瘡寒邪所襲久不愈者尤宜用之未潰則拔毒止痛已潰則補接陽氣其陽症腫痛微甚或重如負石初起用之水出即消其經數日者用之雖潰亦淺且無苦楚○葱熨法生葱搗爛炒熟頻熨患處至冷再換治流注結核骨癰鶴膝等症先用隔蒜灸餘腫尚存用此發之以助氣血行壅滯其功甚大又跌撲損傷止痛消腫散血之良劑也

洗毒肉汁易求

洗毒散蛇床子地骨皮紫花地丁草麻黃荆芥防風枯礬各三錢葱白三根水三碗

煎至二碗於無風處洗之治諸般惡瘡及風濕陰蝕瘡○肉汁湯白芷甘草羌活蜂房黃芩赤芍當歸各一錢用猪

蹄爪肉一斤煮汁分二次去油花肉查方入煎藥煎十端俟溫以絹蘸湯揩洗惡血隨洗而下忌風冷婦人猶大治

一切瘡

點漆煙灰膏

點漆煙灰膏用響糖煙肉灰一升半風

滾湯三碗慢慢淋自然汁一碗銅鑊盛慢火熬如稀糊先下巴豆末次下蟾酥各二錢白丁香末五分炒石灰一錢攪勻再熬如乾麪糊取起俟冷以磁罐盛貯勿令泄氣每用時以簪頭挑少許放指甲上研口呵氣調勻如泥將患

處用針撥開以藥點之治一切無名腫毒惡瘡及外痔瘻
瘻氣栗除癰點疔等症有膿者點無膿者就散惟好肉及
眼上忌用如點癰瘻去瘀血加輕粉一錢更痛加乳香沒
藥各一錢尋常消癰點疔只用灰膏不必加藥○去惡毒
雄黃一錢巴豆一箇同研如泥入乳香沒藥各末少許又
再研勻如諸瘡毒有惡肉不能去者每取少許點上即去
敷分陰陽 陰陽散赤芍生血止痛去風白芷去風生肌上
肌各二兩獨活三兩止風動血紫荆皮五兩破氣逐血消
腫為末葱酒或醋調敷治癰疽腫毒流注此藥平和妙日
陰陽○抑陽散天花粉三兩姜黃白芷赤芍各一兩為末
茶湯任調敷治癰疽屬陽症○抑陰散草烏一兩白芷赤
芍南星各一兩肉桂五錢葱湯或熱酒調敷治癰元氣虛
寒腫不消散或不潰斂或筋攣骨痛一切冷症神效○鷄
血散用雄雞剪去冠尖少許剉提滴血瘡上血盡再換不
過五六鷄痛止毒消其瘡自愈內以人參六兩分作六次
煎服治癰疽屬陰症○鐵箍散乳香沒藥大黃黃柏
各等分用星半夏防風羌活皂刺木鱉子瓜蒌根阿膠甘草

節草烏各等分爲末醋調成膏砂鍋內火熬黑色敷之寒
者熱用熱者寒用治癰疽腫痛赤暈散漫及諸般瘡癤○
鉄井欄芙蓉葉重陽前採蒼耳葉端午前採燒存性爲末
蜜水調敷一切腫毒背癰以此藥圍定不復畔開○單巴
豆膏巴豆炒焦研如膏須臨用製之度不乾燥如發背中
夾肉死塗之卽腐未死塗之生肌惡瘡癰瘡久不收斂內
有毒根以紙撚蘸藥納之根去卽斂元氣虛弱或因社伐
胃氣以致毒氣散漫中夾肉死急服大補之劑中塗三四
寸許至五六日赤點之界自裂紋如刀割狀中夾肉潰若
脾氣大虛肉不知痛急煎脾胃肉多復生○單小粉膏用
隔年小粉愈舊者愈好不拘多少入鍋炒之初炒如錫煖
久則乾成黃黑色候冷爲末陳米醋調令稀糊得所以磁
罐收貯如一切癰疽發背無名腫毒初發微熱未破者量
所腫大小用厚皮紙攤開中剪一孔以泄毒氣貼上卽如
米冷疼痛卽止少頃覺痒不得揭動久則腫毒自消其効
如神○單糯米膏揀淨糯米三升入磁盆內於端午前四
十九日以冷水浸之一日兩度換水時以輕手淘轉勿令
米碎至端午日取出用絹袋盛之風乾每旋取少許炒黑

爲末冷水調成膏量瘡口大小貼之縮帛包定直候瘡愈
爲度若金瘡誤犯生水瘡口作膿急以此藥裹定腫處已
消直至瘡愈若癰疽毒瘡初覺微腫時貼之明其刺出在藥內若
處若竹木簪刺入肉者臨卧貼之明日其刺出在藥內若
貼腫毒乾即換之常令濕爲妙
瘡口不可換恐傷瘡口
線有三品
上品銀子專治
紅磬二兩半乳香沒藥硃砂各三錢牛黃五分半硃砂一
錢熟四分生白信火煨一兩○中品銀子專治翻花瘰癧
等症白磬三兩八錢半乳香沒藥各五錢半硃砂三錢牛
黃七分半硃砂五分熟五分生金信一兩半火煨黑烟止
用淡清烟○下品銀子專治發背疔瘡等症紅磬三兩二
錢乳香六錢沒藥五錢硃砂三錢牛黃四分半硃砂二錢
四分半熟半生白信三兩火煨黑烟盡半日取起用各依
法製爲末麪糊和勻捻成錠子看瘡漏大小深淺插入錠
子如肉內黑色勿上生肌散直待黑肉去盡方可上生肌
散若瘡無頭者用太乙膏加沒藥一粒貼之白磬二兩乳
香三錢二分沒藥三錢七分硃砂四分半牛黃五分白信二
兩火煨烟盡半日取用巴霜三錢白丁香二錢半姜黃三

錢半爲末或噀津調敷一日換三次但瘡破插上前錠子

○通用青金錠子銅綠三錢青礬膽礬輕粉砒霜白丁香

苦葶藶各一錢片腦麝香各少許爲末麪糊或煉蜜加白

及末爲錠子如麻黃大二三寸長看瘡口深淺插入疼者

可治不痛者不治如開瘡口用生砒去死肉用煨砒生好

肉去砒加枯礬○取久疽久痔漏中朽骨法用烏骨雞脰

骨以信石實之鹽泥固濟火煨通紅地上出火毒取骨爲

末飯丸如粟米大以皮紙燃送入竅內外用膏藥封之其

骨自出

取膿射膿透膿 隔皮取膿法鹽蹄肉焙蕎麥粉炒各

一兩白鹽五錢草烏四錢爲末水調

作餅慢火炙微黃色去火毒爲末醋調成膏攤厚紙上貼

患處水自毛孔而出其膿自退諸般腫毒皆效○射膿法

枯礬黃丹各一錢砒霜五錢分爲末麪糊爲丸捻作錠子每

用粘藥於頭欲出處以膏貼之自潰治諸瘡和膿水已成

卽當針開決出陳臭惡痰若惡痰不出須當用此藥以射

其膿○又方用陳壞米一錢硃砂五分白丁香廿一粒爲

末粳米粥丸粳米大每用一丸粘瘡上以膏貼之其膿自

潰○透膿散蠶繭一箇燒灰酒調服卽透一箇瘡口若用

兩三角即透兩三角瘡口或用黃蠟作小丸服之俱不可多服治諸癰瘡及附骨疽不破者不用針刀一服即破

生肌完肌平肌

生肌定痛散乳香沒藥龍骨硃砂雄黃各一錢血竭兒茶海鱉鱗各二錢赤石脂五

錢白芨白欬各一錢半片腦一分或加天靈蓋一錢為末

白芷二錢半血竭二錢黃丹辰砂各五錢石炭一兩煅明

少許為末先將黃蠟一兩溶化入香油少許然後入藥末

攪勻得所捻成條子塞瘡口內肌肉自長如痛甚加乳香

沒藥各二錢○完肌散定粉枯礬黃連乳香龍骨各二錢

黃丹輕粉各一錢為末搽之○平肌散狗頭骨露蜂房

頭髮各燒存性一錢桑白皮五分麝香輕粉各少許為末

津液調敷治漏瘡及一切癰漏經久不合○易簡方端午

斷血金毛無踪

樣石灰搗爛陰乾為末乾搽乾者麻油調搽不問金刀跌撲狗咬湯火所傷神效○斷血金毛無踪

藥子七錢半 一方加白芨乳香輕粉為末敷上以絹帛扎定治金瘡出血不止及諸瘡疼痛膿血不乾久不生肌

歛口木櫝有雀

歛口藥輕粉木香黃連白芨為末貼肉痛

氣舒泄未盡必於其傍復發大疽○古香柳散木香櫝柳各等分為末搽上乾者蠟油調塗生肌歛肉止痛甚速一方加黃連當歸各等分○單方用經霜桑葉為末頻搽治瘡大瘻不歛外又以桑葉煎湯洗之或加白欬白芨雞脰胚之類亦好

外貼內服太乙雲母麒麟芳神應萬應千槌欽成

丹 太乙膏玄參白芷當歸肉桂大黃赤芍生地各一兩用油二片半浸夏三冬十春秋七日方入銅鍋內文武火煎至藥枯黑瀝去查入黃丹十二兩以挑枝不住手攪煎至滴水成珠軟硬得中即成膏矣治一切癰疽腫毒不問年月深淺已未成膿者並宜如發背先以溫水洗拭攤餅鋪貼之更用冷水送下血氣不通溫酒下赤白帶當歸煎酒下咳嗽及喉閉纏喉風綿裹含化一切風赤眼貼兩太陽穴更以山柅煎湯下打撲傷損外貼內服陳皮煎湯下

腰痛外貼內服鹽湯下唾血桑白煎湯下婦人經閉腹塊
作痛貼之經行痛止一切疥瘡別煉油少許和膏塗之虎
犬蛇蝎湯火金瘡傷並外貼內服諸瘰癧瘡癰及楊梅瘡
毒潰爛先用鹽湯洗淨貼之並用溫酒下三五十九粒
大以蛤粉爲衣其膏可收十年不壞愈久愈烈雲母膏
川椒白芷赤芍肉桂當歸菖蒲黃芪白朮川芎木香龍膽
草白薇防風厚朴桔梗柴胡人參蒼朮木黃芩附子茯苓良
姜百合皮松脂各五錢甘草柏葉桑白皮槐枝柳枝陳皮
各二兩用豬油四十兩浸封七日文武火煎以柳木不住
手攪候匝沸乃下火沸定又上火如此者三次以藥枯黑
漚去查再熬入黃丹廿兩沒藥並花血竭麝香乳香各末
五錢雲母硝石各末四兩以槐枝不住手撓滴水成珠不
軟不硬爲度磁器收貯候溫將水銀二兩以絹包定以手
細彈鋪在膏上各養膏母用時先刮去水銀或九梧子大
服或攤絳布上貼隨宜用之如發背敗瘡前湯洗拭貼之
內服一兩分三次溫酒下未成者即愈乳癰瘰癧瘡疽毒
至骨外貼內服一兩分三次酒下甚者即瀉惡物腸癰
五兩分五次甘草煎湯下未成膿者消已成膿者隨

藥下膿下後每日仍酒下五丸膿止住服發頤發頤發
發耳臍癰牙癰牙疼癰癰及一切癰癰腫毒並外貼時
毒消痛止而愈甚者內服風眼貼兩太陽穴小腸氣茴香
煎酒下一分日二服即愈難產溫酒下一分血暈欲死姜
汁和童便溫酒下一九即醒死胎榆白皮煎湯下五錢即
生壁虎蜈蚣咬外貼留瘡口虎豹咬并草煎湯洗拭貼之
每日一換蛇犬咬外貼內服十九生油下箭頭入肉外貼
每日喫熟棗豆少許箭頭自出中藥酒下一分每日一
服四日漏出惡物立瘥但有所苦藥到即愈忌羊血餘無
所忌如收此藥防身以蠟紙裹上令風乾可相三十年不
損藥力○麒麟竭膏當歸木鱉肉知母五倍子細辛白芷
各五錢埋柳枝各十四寸一方用山茨菇紅芽大戟巴豆
各五錢用香油三兩半同煎八未入鍋內文武火煎以柳
枝不住手攪煎至藥枯黑濃去渣入松香末十兩熬清未
二兩仍不住手攪如沸溢即下火攪之再上火一茶頃滴
水成珠不軟不硬即入血竭三錢輕粉麝香各二錢雄黃
四錢乳香沒藥各末五錢徐徐而下速攪極勻疑則再上
火勿令沸溢傾入水中浸半日後以手搏之漸漸軟和希

覆探批如金絲之狀再入水浸之如前探批春夏頻換水
多浸愈妙緊急亦浸兩宿治一切癰疽五發毒瘡生者貼
之即散熱者即穿透敗生肌首尾可用一切疔腫結核並
此患周腫瘡先用薑汁白蜜入湯洗淨以牛蒡子葉或金
剛藤葉先貼半日取盡惡水然後貼膏刻日可愈一切腎
風黃濕痒痛等瘡並洗拭貼之一切打撲傷損閃到氣悶
等症並貼患處頭疼貼兩太陽穴赤眼貼眼胞魚尾暴陽
風冷嗽貼脊心牙疼刮藥塞牙縫面腫貼面小兒疳積等
疾爲丸菉豆大米飲下二三十丸一切風寒濕痺臂腿疼
痛俱貼痛處無不立刻○神應膏香油一片入亂髮一團
鷄子大於鉢中文武火熬至髮枯入杏仁一兩再煎枯黑
灑去渣入黃芪七錢半玄參五錢熬一二時久住火候火
力稍息入帶子蜂房一兩蛇退五錢以柳木不住手攪慢
火熬至枯黑灑去渣入黃丹五兩不住手攪勻滴水成珠
不軟不硬磁器收貯隨意攤貼治諸般癰腫癰毒外科神
藥人多忽之○萬應膏木香川芎牛膝生地細辛白芷秦
朮歸尾枳殼獨活防風大楓子羌活黃芩南星草麻子半
夏木貝母赤芍杏仁白薇茅香兩頭尖艾葉連翹川烏

甘草節肉桂良姜續斷歲靈仙荆芥藁本丁香金銀花丁
皮麝香紅花青風藤烏藥蘇木玄參白蘚皮姜蠶草烏桃
仁五加皮山柃牙皂苦參穿山甲五倍子降真節骨碎補
蒼耳頭蟬退蜂房鱉甲全蝎麻黃白芩各一兩六黃二兩
蜈蚣廿一條蛇退三條桃柳榆槐桑練楮七樣樹皮各廿
一寸用麻油十二斤浸春五夏三秋七冬十日方入銅鍋
內文武火煎至藥盡油濃去渣磁器內貯另用松香一斤
溶化入前藥油二兩同煎成珠不軟不硬仍入水
中一番覆揉扯如金色即成膏矣治一切風氣寒濕手足拘
攣骨節酸疼男婦人瘡積女人血瘕及腰膝痛諸般疼痛
結核轉筋頑癬頑瘡積年不愈腫毒初發楊梅腫硬未破
者俱貼患處肚腹疼痛瘡痢俱貼臍上痢白而寒者尤效
咳嗽哮喘受寒惡心胃膈脹滿男婦面色萎黃脾胃等症
及心疼俱貼前心負重傷力渾身拍痛者貼後心與腰眼
諸疔小腸氣等症貼臍下神效○千槌膏白松香一斤草
麻仁杏仁各三兩紅銅青三兩乳香沒藥各一兩半輕粉
二錢共入石臼內向以下以木杵槌成膏如燥少加香油
造之磁器收貯每用忌火宜於湯內溶化紅絹攤開貼之

凡般癰毒無名惡瘡未成者散已成者拔毒追膿
如腹中痞塊及癰疾貼大椎及身推穴其効如神 呼膿

長肉白蠟琥珀水粉白膏紅膏綠膏如練錦膏
此膏長肉

片入桃柳槐枝各七寸頭髮一團鷄子大熬焦枯入雷歸

黃芪黃連各一兩半黃柏黃芩大黃白芷杏仁防風荆芥

羌活獨活連翹山梔各一兩赤芍地黃白芍及青風藤金銀

花各八錢文武火煎至藥枯黑瀝去查入黃丹半片黃蠟

五兩瀝青二兩同煎至油滾漸漸加之滴入水中軟硬得

所方入乳香沒藥各末五錢血竭輕粉各二錢急手攪勻

磁器收貯專治癰疽發背疔癰等毒已破出一膿者油紙攤

貼如膿多用絹揩淨將此膏於火邊烘再貼第三次另

換一箇貼之貼得將口量瘡大小貼之○白蠟膏當歸

生地各一兩用麻油一兩煎藥枯黑瀝去查入白蠟或黃

蠟一兩溶化候冷攪勻即成膏矣治癰疽發背湯火等症

去腐生肌止痛補血續筋又與新肉相宜其効如神或加

乳香沒藥龍骨血竭兒茶輕粉尤妙○琥珀膏歸尾川芎

黃芪霜蜂房皂角升麻甘草梢單麻子木鱉子芍藥白蔞

獨活、藁本、防風、稍拘杞子、瓜蒌仁、蘇木、白芷、杏仁、黃連、地
枝各一兩，用水五大碗，煎至減半，去渣，其渣再用水五大
碗，煎至減半，去渣，與前汁和勻，以槐枝不住手攪，慢火熬
至成膏，入香油四斤，其酥二兩，羊腎脂油四兩，攪勻，文武
煎至水盡，約以紙條燃着，不爆為度，方徐徐入黃丹二斤，
柳枝不住手攪，滴水成珠，軟硬得所，如軟，添形硬，再加油
再熬，乃入琥珀、木香、乳香、沒藥、雲母、雄黃、硃砂、甘松各末
二錢半，藥灰二兩，枯椿一兩，輕粉、麝香各末二錢，急攪令
極勻，微煎數沸，以磁器收貯，厚紙紅絹攤開，量瘡大小貼
之神效。治五發惡瘡、疔腫、癰癤、遠年冷痺、痔漏一切無名
腫毒，及虎犬咬傷，並皆治之。○水粉膏：黃丹半斤，水粉四
兩，研勻，用麻油一斤，煎至滴水成珠，次下乳香、沒藥、龍骨
血竭、兒茶、輕粉各末二錢，攪勻，以磁器收貯，攤紙貼之，治癰
疽、瘰癧、生肌、斂口，止痛如神。艾炙火瘡，不須下乳，沒等藥
便好。○白膏藥：水粉一兩半，赤石脂一兩，樟腦五錢，輕粉
二錢半，為末，用生豬脂去膜同搗，成膏，先將生肌散粉上
然後貼之，神效。○紅膏藥：先以黃蠟一兩，溶化，次下香油
三錢，黃丹五錢，攪勻，再熬成膏，以磁器收貯，貼諸瘡毒及湯

火金瘡等傷○綠膏藥銅青華麻子各一兩松香四兩木
驚子五十箇杏仁五錢巴豆五枚乳香輕粉各二錢為末
搗勻於淨石上用斧槌千餘下成膏收貯水浸旋用治諸
般惡瘡腫毒軟肺○貼膏藥法如瘡有膿血不淨亦藏閉
礙須用藥水洗淨拭乾候水氣乾却用膏貼貼後有黃水
膿血流出用紙揩從側畔出一日一換黃水膿血止兩日
三日一換至愈凡洗我換膏必
須預備即貼之新肉惡風故也
吁瘍醫設天官掌制毒

有方創子手菩薩心誤傷何忍

月禮天官掌瘍醫制
五毒方為外科之祖

拾遺

二香散

紫蘇陳皮蒼朮厚朴扁豆甘草各五分香附一錢
半香茹一錢生姜木瓜各二片葱白二莖水煎熱

服治四時感冒冷熱寒暑嘔惡泄利腹痛瘴氣飲冷當
風頭疼身熱傷食不化如外感腫滿倍加車前子木瓜

紫參湯

即小紫胡湯合四
苓散退熱止瀉

胃苓湯 即平胃散合四苓散

荆防敗毒散 即人參敗毒散加荆芥防風牛蒡子薄荷煎服治一切風熱丹毒風疹風腫及大頭

病等症如內熱加茶連口渴加天花粉

枳梗二陳湯 即二陳湯加枳殼桔梗寬胃膈化痰痞滿

參連二陳湯 即二陳湯加黃連黃連善化痰降火

梔子乾姜湯 山梔七枚乾姜一兩水煎溫服得吐即止治醫以丸藥大下身熱不去微煩蓋丸藥不能

除熱但損正氣邪氣乘虛留於胃中而未深入則身熱不去而微煩是用山梔苦寒以吐煩乾姜辛熱以益氣

三白姜棗湯 即三白湯加姜棗煎服治汗下後頭項強發熱無汗心煩痛小便不利

八珍湯 即八物湯去白朮砂仁等分姜七片棗三枚水煎服和血氣理脾胃

丁香爛飯丸

丁香三稜莪朮木香各二錢甘草甘松砂仁丁香皮益智仁各六錢香附一兩為末湯浸

蒸餅為丸三ノス菉豆大每卅丸白湯下三ノス或細嚼服之亦可治飲食所傷二

三稜消積丸

三稜莪朮炒麴各七錢巴豆和皮米炒黑焦二去米青皮陳皮茴香各五錢丁香皮益智仁

各二錢為末醋糊丸三ノス每十丸至廿丸溫姜湯下三ノス加減得利即止治傷生冷硬物不能消化心腹滿悶二

導氣枳實丸

茯苓黃芩白朮黃連各二錢澤瀉二錢大黃二一兩枳實神麴各五錢為末湯浸蒸餅丸三ノス菉

豆大一倍每五十丸至七十丸白湯下治傷濕熱之物不得施化而作痞悶不安二

大枳壳丸

我朮厚朴人參青皮黑豆枳壳茯苓木香陳皮二白朮半夏麥芽神麴二稜各一兩檳榔大黃各

二兩一方有乾生姜五錢為末姜汁糊丸三ノス梧子大每三四十丸姜湯下常服美食治一切酒食傷胸膈閉悶痰痛飲食不消兩脇刺痛二嘔逆惡心並皆治之

三黃枳朮丸

黃芩二兩黃連大黃神變陳皮白朮各一兩枳實五錢為末湯浸蒸餅為丸棗豆大一倍

每五十丸白湯下量所傷服之治傷肉食濕熱辛辣厚之物填塞悶亂不快

木香枳朮丸

木香枳實各一兩白朮二兩為末荷葉煨飯搗丸梧子大每五十丸溫水下破滯氣消食

橘半枳朮丸

橘皮半夏枳實各一兩白朮二兩為末荷葉煨飯搗丸梧子大每五六十丸橘皮煎湯下

治飲食傷脾停積痰飲心胃痞悶如食不消加神曲麥芽氣逆加木香白豆蔻胃脘痛加草豆蔻氣升加沉香

南星丸

南星黃芩酒浸香附蒼朮童便浸各二兩川芎酒浸一兩半山梔炒一兩龍膽草酒浸陳皮連翹薤

藠子青黛各五錢柴胡三錢為末神曲糊丸服病即至春夏便當作餅治

卻痛散

五靈脂蒲黃各五錢當歸肉桂薑蒲木香胡椒各一兩川烏一兩半每四錢入食鹽米醋少許水煎

溫服治心氣

冷痛不可忍

古玄金散

玄胡索 金鈴子 各一兩 爲末 每二錢 溫酒或白湯調服 治熱厥心痛或發或止或久不愈者

三味玄胡散

玄胡索 肉桂 各一兩 木香 二錢 爲末 每二錢 姜湯或酒調服 治冷心痛

三味川練散

川練肉 山梔 各一兩 菖蒲 二錢 爲末 每二錢 姜湯調服 治熱厥心痛

海金砂散

海金砂 煅石 各一兩 甘草 一分 爲末 每二錢 麥門冬或燈心煎湯下 治膏淋

加減八味丸

熟地 八兩 山藥 黃山藥 各四兩 茯苓 附皮 澤瀉 各三兩 五味子 肉桂 各一兩 爲末 地黃

膏加蜜丸

每七八十丸 白湯下 治腎水枯涸虛火上升口乾作渴或舌黃裂或小便頻數或口舌生瘡

或兩足發熱或痰氣上湧而後患疸宜預服之

沈沈丸

半夏 麝香 烏梅 代赭石 砂仁 各三錢 丁香 香檳榔 各二錢 杏仁 白木 木香 沉香 各一錢 陳皮 五錢 白豆蔻

巴霜 各半錢 爲末 醋糊丸 黍米 大每五十丸

水姜湯下 治中焦吐食由食積寒熱相併

增損五積丸

黃連肝積五錢脾積七錢心脾一兩半厚朴
肝心脾五錢脾腎八錢川烏肝脾一錢心腎

脾五分乾姜肝心五分肺腎一錢半人參肝脾肺二錢

心五分茯苓一錢半巴霜五分為末蜜丸梧子大初二

九加微酒治積塊不拘臍上下左右通用如肝積加柴

胡一兩卑角卑布各二錢半川椒四錢莪朮三錢心積

加黃芩三錢肉桂茯神丹參各一錢菖蒲五分肺積加

桔梗三錢天門冬青皮陳皮白豆蔻各一錢紫苑川椒

各一錢半脾積加吳萸黃芩砂仁各二錢澤瀉茵陳各

一錢川椒五分腎積加玄胡索三錢苦練肉全蝎附子

獨活各一錢澤瀉菖蒲各二錢肉桂二分丁香五分終

冬加厚朴一倍裁麥連覺熱加黃連覺悶亂加肉桂氣

短裁厚朴又有虛人不可直攻以蠲遺其藥又且久

留磨積其肉積酒積痰積等照依纂集積丹例加減

五仁丸

柏子仁桃仁松子杏仁郁李仁各一兩研膏另用
陳皮末一兩入煉蜜為丸服治血虛大便艱難

五參散

人參玄參丹參沙參各二兩白花蛇一截為
末每二錢空心臨卧酒下治五臟虛風癰瘰惡瘡

鴨頭丸

防已一兩 甜葶藶各五錢 為末 鴨頭血為丸 服蓋鴨頭血能利水而聚血故也

撞關飲子

烏藥一錢二分 香附一錢 砂仁八分 三棱白豆蔻甘草各五分 丁香 香沈香各二分 水煎或為末

服治脹滿用此衝開關格使氣通而滿自消也

雄硃丹

大黑豆四十粒約五錢 重端午日以冷水浸從早至巳時去皮晒乾研入信石末一錢 再研

糊為丸 少壯人如梧子大 老人黃豆大小 兒菜豆大 黃硃砂為衣 晒乾收貯 瘡臨發五更一服 井水下

一補一發丹

茯苓一兩半 夏陳皮柴胡黃芩蒼朮葛根各七錢 常山三錢 為末 麴糊丸 梧子大 每七十

丸白湯下 治久瘧內傷挾外感 間發內必主痰外以汗解如牙多去葛根氣虛加入參白朮熟甚加黃芩黃連

寒多加甘草口渴加烏梅

別錄

散白朮一兩 天雄附子肉桂乾姜諸根各三錢 茵芋葉桑寄生各五錢 細辛菖蒲各二錢 熱者去雄附

姜桂加知母黃柏各三錢當歸地黃各五錢為末空
白湯調服二錢治心風為病男夢見女女夢見男宜此
去邪使不復見故云別離

水輪丸

附子乾姜肉豆蔻各等分為末米糊為丸服使
脾土運轉如輪五穀易消而大腸傳送有常

金櫻丸

金櫻子二升去穢以酒二升砂鍋內熬膏桑白皮
二兩鵝頭實五錢桑螵蛸酥炙一分白龍骨五錢

蓮花二分為末入膏為丸如梧子大空心溫酒
鹽湯下三十丸更入麪糊易丸治遺精或有咳

烏犀丸

巴豆一百粒八箇去心膜用沉香水浸過橘皮一
兩去白切片將巴豆拌和受曉露七夜文武火炒

令黑色揀出巴豆令去油盡蒼木不錢去犀皮濃煎犀
角水浸受太陽七日晒乾微炒逐將橘皮同碾為末將
巴豆和入末內碾勻水浸蒸餅為丸蘿蔔手大量兒大
小加裁丸數臨臥生薑湯下治小兒驚癇積聚腹大潮
熱撮指咬甲蛔蟲自利頸核腹痛遍身瘡疥小便如泔
多汗嗜泥炭或癰或渴或吐或瀉或百日內瘰癧絞刺

啼叫脾虛易為傷犯為疾發生並宜服之常服消宿食破滯氣發散癰毒

百倍丸

牛膝補骨脂龜板各一兩肉苁蓉虎骨各五錢木鱉子乳香沒藥自然銅各二錢為末蜜丸梧子大空心溫酒鹽湯任下三十九丸治腎虛腰膝痛風及折傷補損有百倍之効

潤腎丸

蒼朮一片用韭菜一片搗汁拌九蒸九晒又用小茴一片同蒸一次去茴晒乾熟地黃一片五味子半片乾姜冬一兩夏五錢秋七錢虛寒加韭子有火加黃柏各一兩大便燥加黑芝麻四兩為末棗肉九梧子大空心米飲下五十七丸治脾腎俱虛善退勞熱蓋脾苦燥以蒼朮煉之腎苦燥以姜棗潤之五味收之是也

草還丹

蒼朮四兩用酒醋米泔並水各浸一兩胡蘆巴故紙小茴川烏川練肉各一兩覆盆子二錢木香五錢山藥穿山甲地龍茯苓枸杞子牛膝各三錢為末酒糊丸梧子大每五十九空心溫酒鹽湯任下以乾物壓之大壯脾胃進飲食益精髓補腎經固元陽輕腰脚安五臟通九竅明目悅顏色身髮固齒真延年之劑也

黃芪丸

黃芪烏藥茴香地龍川椒防風川練肉赤小豆白
茯苓海桐皮威靈仙陳皮各等分爲末酒糊丸梧

子大每三十丸空心溫酒下治腎臟虛風攻

注手足頭面麻痺痛痒或生瘡疥腫癢癰腫

大黃散

大黃川芎各一兩甘草黃芩枳殼各五錢每一錢
入紫草少許水煎溫服治熱瘡及瘰癧大便不通

取漏膿法

皮硝三兩苦參一兩半爲末用布四寸長三寸
潤縫一袋入藥半袋以批二分放藥末中間方

入藥裝縫袋中兩頭安帶跨馬繫住
治內痔久漏取膿最效惟牛乳外痔不用

枇杷葉丸

枇杷葉蜜炙二片山藥一片枸杞子山藥黃各
半片吳茱萸一兩爲末蜜丸梧子大每七八十

丸清米飲下治婦人血崩經事
失期或前或後能令有子極効

紅花湯

水蘊花茅香紅花槐花白鷄冠花各等分水
煎服忌腥滑發氣之物治男女諸般血病

史國公浸酒方

防風羌活虎骨鱉甲陳麝砂炒油松節
白朮各二兩秦艽九華薛當歸杜仲各二兩

牛膝一兩著耳子四兩枸杞子五兩野茄根蒸熟晒乾
入兩各咀細盛布袋中入大坛內入好酒三十五斤封
坛口浸十四日滿將坛入水鍋懸煮一時取坛入土內
埋三日去火毒每日清晨午後各服五七鐘大有補益
治半身偏枯手足拘攣一切
風疾神效衰年除患者亦宜

固本酒

生地黃熟地黃天門冬麥門冬人參白茯苓各四兩
兩如土熟去入參下虛寒加韭子二兩婦人虛寒

用核桃連皮為引久服生子如法浸酒服忌蘿蔔葱蒜
給虛癆身弱一方去茯苓加牛膝枸杞黃柏木香砂仁

仙酒方

蒼朮二兩枸杞當歸川芎白芍陳皮天麻各一兩
晚歸沙五加皮杜仲枳殼半夏肉桂防己牛膝桔

梗木瓜白芷各五

錢如法浸酒服之

五積酒

用五積散去麻黃加防己杜仲牛膝風熱合敗毒
散同浸查可為丸治虛寒筋骨痠疼腰脚無力

婦人小兒外種用藥賦及拾遺

終

雜病婦人小兒外科總方

氣類

四君子湯

扶胃降火補虛固本氣虛有熱用之性緩不暴
不助虛陽故能君子治男子一切內傷外感及

小兒脾胃不調等症若女子氣虛亦宜用之惟血虛
者不宜單服耗血一切大病後最宜服之以調脾胃

人參

一錢補中益氣

白朮

二錢失胃健脾

茯苓

二錢養心利水氣弱腎無邪水者去之

甘草

六分和中降火

生薑

三片有汗去之

棗子

一枚水煎不拘時溫服痰加陳皮半夏竹瀝姜

汁虛勞有熱合四物湯內傷停飲目眩去參加官桂枝

甘草吐瀉加藿香黃芪扁豆泄瀉不止加訶子豆蔻陽

虛加附子脾胃虛弱加官桂當歸黃芪胃冷加附子丁

香砂仁脾困氣短加木香砂仁人參腹脹不思食加白

豆蔻枳實砂仁胃膈喘急加枳實半夏枳殼咳嗽加桑

白皮五味子杏仁心煩口渴倍參加黃芪心煩不定加

辰砂酸棗仁遠志心熱加麥門冬茯苓蓮肉氣痛加玄
胡索小茴當歸氣塊加三棱莪朮茴香附子腹痛加乾
姜赤芍官桂遍身疼痛加赤芍官桂氣虛成痿加蒼朮
黃柏黃芩外感寒熱冬加麻黃桂枝三時加防風羌活
風熱邪加荆芥黃芩薄荷潮熱往來加前胡川芎口渴
加木瓜乾葛烏梅小便不通加澤瀉木通猪苓大便不
通加檳榔大黃小兒風疾加全蝎白附子細辛疹痘已
出未成加升麻乾葛婦人產難加麝香白芷百草霜凡
病後調理加陳皮病後虛熱加柴胡當歸升麻餘可類
推量病依藥性百般加減由人又有變方之法如三
白湯六君子湯觀音散異攻散補中益氣湯及烏藥順
氣散木香勻氣散七氣湯凡溫氣快氣行氣散氣降氣
破氣消氣補氣清氣皆
自此方而變化之也

六君子湯

治脾臟不和嘔吐少食頭目不清上燥下寒服
熱藥不得者即四君子湯加陳皮半夏各等分

甘草減半姜棗煎服凡小兒養胃湯四散飲衛
生湯托裏清中湯之類皆自此方而變化之也

血類

四物湯

調益氣血治衝任月事不調臍腹疼痛

崩中漏下將理失宜胎動不安血下不止及產後
乘虛用寒內搏惡露不下小腹堅痛時發寒熱等症若
男子精血虛損發熱亦宜用之蓋女子以血為主而氣
為之本氣順則血活氣滯則血死故欲治血當先理氣
男子以精為主而血為之本血盛則精強血衰則精竭
故欲益精當先補血故
二方為男女通用也

白芍

二錢半緩中破血腹痛非此
不除心經藥也夏月倍用之當歸
二錢潤中和血
刺痛如刀非此

不除

腎經藥
也冬倍用之熟地
二錢半滋陰生血
臍痛非此不除肺
經藥也秋月宜倍用之男子加此

川芎

二錢清陽和血行血頭痛非此
不除肝經藥也春
倍用之女人亦倍水煎溫服常服順四時之氣而

有對症

不愈者失其輔耳風加羌活防風熱加黃芩燥
加天門冬寒加桂心陰虛火動加知母黃柏有嗽加二

陳湯少許老人性急作勞兩腿痛加桃仁陳皮牛膝生
甘草入生薑研潛行散熱飲三四貼而安貧勞人秋深
渾身發熱手足皆疼如燬晝輕夜重倍芍芍加人參五
味子如喘手足仍疼加牛膝人參白朮桃仁陳皮甘草
檳榔生薑五十貼而安如性急人味厚常服熱燥之藥
左脇紅點痛必有膿在內加桔梗香附生薑煎服十餘
貼痛處腫針出膿再用數貼調理而安如貧婦性急血
如注倦甚加香附側柏四服覺渴單服十餘貼而安如
懷子瘕症不能言加硝磺各一錢蜜少許沈冷時時呷
之心火下降肺金自清則能言矣其餘照依藥性類推
及婦人門加減○又如犀角地黃湯當歸和血散凡補
血溫血生血涼血止血行血破血消積血皆自此方而
變化之也

八物湯

治氣血俱虛男婦百症小兒疹痘通用即四君子
湯合四物湯水煎溫服加減同前右痰合二陳湯

名八物二陳湯凡人參養榮湯上全太補
湯人參養榮湯之類皆自此方而變化之也

○痰類

二陳湯

痰乃脾胃津液周流運用血氣由之如道路然不可無者濕盛痰多加以外感固滯於中斯為患耳

痰不盛者有感亦輕風寒客之煖以相火則上攻心目而為暗風痰厥暑濕乘之血氣相着附於筋骨而為腫毒癰患怒火迷竅則為顛狂十病九痰誠哉此方總括一身之痰如要上行加引上藥如要下行加引下藥惟酒痰燥痰不宜

陳皮

二錢和脾消痰利氣

半夏

一錢燥濕豁痰溫中血虛燥症須用姜汁製麴

茯苓

八分行發

參濕甘草

四分健脾瀉火和中

生薑

三片水煎溫服如血虛合四君子湯濕痰

身重倦怠加蒼朮寒痰氣喘加杏仁麻黃細辛紫蘇風痰加南星姜蠶皂角痰盛加竹瀝姜汁熱痰加黃芩黃連胃脘痰火加石羔痰結吐不出加瓜蒌仁血痰加黃芩麥門冬知母芍藥竹瀝姜汁胃中鬱痰加香附枳實

胃中老痰及虛痰燥痰去半夏加貝母海粉各病照依藥性類推加減由人○又如星香散導痰湯凡一切行痰消尅痰積之藥皆自此方而變化之也

○ 鬱類

越曲丸

凡願欲不遂如寡婦僧道之類名利不遂或先富後貧之類或久病不愈皆宜用之

蒼朮神曲 川芎 中 桅香附

各等分爲末水丸薑豆大溫湯下七十丸蓋氣血痰三若

多有兼鬱而鬱有六隨症加減如氣鬱胃脇痛脉浮細合四君子湯血鬱四肢無力能食便紅脉沈合四物湯痰鬱動則喘寸脉沉滑合二陳湯濕鬱周身走痛或關節痛遇陰寒則發脉沈細加白芷茯苓熱鬱小便赤脉淡數加青黛食鬱噯酸腹飽不能食左寸脉平和右寸脉緊盛加山查針砂春諸鬱加防風夏諸鬱加苦參秋冬諸鬱加吳茱○又如六鬱湯流氣飲子四七湯分氣飲之類皆自此方而變化之也

六鬱湯 能解諸鬱

陳皮半 夏川芎 蒼朮 各一錢 赤茯苓 山梔仁 各七錢 香附 二錢

砂仁 甘草 各五分 生薑 三片 水煎溫服 隨症加減

陰虛生內熱湯

當歸 川芎 蒼朮 陳皮 各八分 白芍 山梔 天花粉 各六分 白朮

麥門冬 夏月多用 沙參 各七分 玄參 五分 黃柏 三分 甘草 二分 生薑 三片

水煎服或以山藥代參朮久服去川芎冬月加破故紙此方與下陰分生陽湯義相發明

陰分生陽湯

白朮 七分 白芍 六分 當歸 一錢 甘草 二分 蒼朮 五分 陳皮 八分 生薑 三片

棗子

一枚或加參苓或以山藥代參苓水煎服入蜜亦可加肉蓯破故紙亦可冬日尤宜用故紙蓋以三

焦者乃下焦元氣生發之根蒂也

升陽益胃養榮湯

當歸

一錢全用隨

白芍

八分炒隨白

人參

七分山梔八分

甘草

五分如食之

白朮

五分木通

五分以

生薑

三片棗子二枚

粳米

一撮水煎熱服蓋蒼朮山梔大能除鬱因食冷物鬱火於脾胃者故屬脾脾者土也熱伏地中此病

多因血虛而得之也又有胃虛過食冷物鬱過陽氣於脾土之中並宜服之又肉蓯補骨脂二物冬月可服

已上三方古菴所立鬱門曾纂其畧今更詳之

總方畢

湯水
竹
香
花
絲

